

ご使用に際して、この説明文を必ずよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

ポピョードうがい薬

〔製品の特徴〕

- ポピョードうがい薬は、有効成分のポピドンヨードが細菌・真菌・ウイルスなどに対して短時間に殺菌・消毒効果を示します。
- ポピョードうがい薬は、口臭の除去にすぐれた効果を示します。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は使用しないでください。

本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください。
 - (1) 本人または家族がアレルギー体質の人
 - (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 口内にひどいただれのある人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	悪心
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合


〔効能・効果〕

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

〔用法・用量〕

1回、本剤2～4mL(添付の計量カップ2～4目盛)を水約60mL(計量カップの60目盛)にうすめて、1日数回うがいしてください。

〈使用法〉



添付の計量カップを斜めに
して本剤を2～4目盛の
ところまで入れます。

水を60の目盛りまで入れ
てうすめます。

口中が充分うがいできる
ようにていねいにうがい
をします。

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 定められた用法・用量を守ってください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 本剤はうがい用にのみ使用し、キズややけどへの使用や、内服はしないでください。
4. 本剤は使用するときのみ希釈し、うすめた液は早めに使用してください。
5. 目に入らないよう注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

[成 分]

1 mL中、ポビドンヨード70mg(有効ヨウ素7 mg)を含みます。
添加物として l -メントール、香料を含みます。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料（義歯等）が変色することがあります。

[保管及び取扱い上の注意]

1. 直射日光のあたらない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 誤用の原因になったり品質が変わるおそれがありますので、他の容器に入れ替えないでください。
4. 衣服に付着したときには、水で洗い流してください。
5. 使用期限（容器底部、外箱に表示）を過ぎた製品は使用しないでください。

[包 装]

100mL、250mL

[消費者相談窓口または連絡先]

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、下記連絡先までご連絡いただきますようお願いいたします。

連絡先：ヤクハン製薬株式会社 学術研究部

電話 011-373-1033(代表)

受付時間 8:30～17:30(土・日・祝日を除く)



製造販売元
ヤクハン製薬株式会社
北海道北広島市北の里27番地