

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# うがい薬 コロロダイн

第3類  
医薬品

コロロダイнは、ポビドンヨードを有効成分とするうがい薬で、  
のどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に効果を発揮します。

- (1) コロロダイнは、天然甘味料のステビアエキスを配合。ヨード特有の味を和らげ、うがいがしやすくなりました。
- (2) コロロダイнの有効成分ポビドンヨードが、各種の細菌、真菌、ウイルスなど広範囲の微生物に対し、殺菌・消毒効果を発揮します。



## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

#### 次の人は使用しないこと

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。



### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 次の症状のある人。 □内のひどいただれ
- (3) 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害

#### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状            |
|------|----------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ      |
| □    | あれ、しみる、灼熱感、刺激感 |
| 消化器  | 吐き気            |
| その他  | 不快感            |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称              | 症 状   |
|--------------------|---|
| ショック<br>(アナフィラキシー) | 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |

#### 3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**【効能又は効果】**口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

## 【用法及び用量】

本剤の2～4mLを水約60mLにうすめ、1日数回うがいをしてください。



キャップをさかさにし内側の下にある計量目盛に合わせて薬液を入れてください。

上の目盛までで4mL  
下の目盛までで2mL



計量した薬液を普通のコップに移し、1/3まで水を加えると約60mLになります。

うすめるときは、これを目安にしてください。

### \*〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) うがい用에만使用すること。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4) 本剤は使用する時にのみ希釈し、希釈後は早めに使用すること。
- (5) 定められた用法及び用量を守ること。

**【成分及び分量】** 本剤1mL中ポビドンヨード70mg(有効ヨウ素7mg) 添加物としてℓ-メントール、エタノール、グリセリン、ステビアエキス、香料を含有する。

### 〈成分及び分量に関連する注意〉

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがある。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限が過ぎた製品は、使用しないこと。
- (5) 衣服等に付着すると着色するので注意すること。なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落とすこと。

## 【お問い合わせ先】

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

**サラヤ株式会社 お客様相談窓口**

TEL.06-6797-2525

\*受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)