2008年12月 改訂
2005年７月 作成

服用に際し、この説明書を必ず読むこと。また、必要なとき読めるように大切に保管すること。

内服痔疾患治療薬　　いぼ痔、きれ痔、痔出血に　　第２類医薬品

新コリミジン®錠

製品の特徴

新コリミジン錠は、古くからヨーロッパでうっ血を改善する痔の薬として使われているセイヨウトチノミエキスに、炎症を抑えるリゾチーム塩酸塩や血液循環を改善するビタミンEを配合。さらに胃腸の消化を助ける胆汁末を配合し、快便のお手伝いをします。

使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。）

1. 次の人は服用しないこと。
   本剤または鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること。
   1）医師の治療を受けている人。
   2）妊婦または妊娠していると思われる人。
   3）本人または家族がアレルギー体質の人。
   4）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書をもって医師または薬剤師に相談すること。
   1）服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、悪心・嘔吐

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック（アナフィラキシー）	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさなどとともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさなどがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれなどの激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。

   2）１カ月間位服用しても症状がよくならない場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること。
   下痢。

裏面に続く

成分分量　9錠（成人1日量）中

成　分	分　量	はたらき
リゾチーム塩酸塩	80mg(力価)	消炎酵素剤で、はれを緩和し出血を抑えます。
トコフェロール酢酸エステル（ビタミンE酢酸エステル）	100mg	血行を改善し、はれやうっ血を改善します。
胆汁末	300mg	胃腸の消化を助け、便通を整えます。
セイヨウトチノミエキス	120mg(原生薬として720mg)	血行を改善し、はれやうっ血を改善するとともに、血管を強化し、炎症も抑えます。

添加物としてタルク、炭酸Ca、ゼラチン、サラシミツロウ、セルロース、CMC-Ca、ポビドン、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、白糖、アラビアゴム、リン酸水素Ca水和物、酸化チタン、硫酸Ca、セラック、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、カルナウバロウを含有する。

用法用量

次の1回量を1日3回 食後に服用する。

年　令	1回量
成人（15才以上）	3錠
15才未満	服用しないこと

効能効果

次の場合の症状の緩和：痔核（いぼ痔）、きれ痔、痔出血。

保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
4. 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

〔問い合わせ先〕

1. 購入した薬局・薬店
2. 日水製薬株式会社　お客様相談窓口　電話：03－3837－0987
   受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時
   （土・日・祝日を除く）

製造販売元
日水製薬株式会社
東京都台東区上野3－23－9

副作用被害救済制度の問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構　http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html　0120-149-931

®0812