

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

痔の痛み・はれ・出血・かゆみに

プリザエース 第2類医薬品

〈痔疾用外用薬〉

◆プリザエースは、酢酸ヒドロコルチゾン等、痔の治療に効果的な8種類の有効成分が配合されています。これらの成分がはたらいて、痔の症状である痛み・はれ・出血・かゆみに効果をあらわします。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 1 次の人は使用しないでください
(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)患部が化膿している人。
- 2 長期連用しないでください



👨‍⚕️ 相談すること

- 1 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1)使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。

(2)10日間位使用しても症状がよくなる場合。

成分、保管及び取扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください。

効 能

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・はれ・出血・かゆみの緩和

用法・用量

次の量を肛門内に挿入してください。

年 令	15才以上	15才未満
1回量	 1個	使用しないこと
使用回数	1日1~3回	❌


★ご使用前に入浴するか、ぬるま湯で患部を清潔にし、朝の場合は排便後に、夜の場合は寝る前に使用すると一層効果的です。

[注意]


- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児には使用させないでください。
- (3)本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用してください。また、硬すぎる場合には、軟らかくなった後に使用してください。
- (4)肛門にのみ使用してください。

(坐剤のとり出し方・挿入の仕方)

- 1 1個をミシン目から切りはなします。
- 2 合わせ目を左右に引きはがして坐剤をとり出します。




- 3 肛門内に坐剤を挿入します。すわった状態で坐剤を入れ、手でおさえて肛門に力を入れながら立ち上がると、簡単に挿入することができます。



成分

1個(1.65g)中




成分	分量	はたらき
酢酸ヒドロコルチゾン	5mg	患部の出血・はれをおさえます。
塩酸テトラヒドロゾリン	1mg	
酢酸トコフェロール	60mg	血管を強くし、出血を防ぎます。
リドカイン	60mg	患部の痛み、かゆみをおさえます。
マレイン酸クロルフェニラミン	4mg	患部のかゆみをしずめます。
l-メントール	10mg	
アラントイン	20mg	傷口の治りをはやめます。
塩酸クロルヘキシジン	5mg	細菌の感染をおさえ、傷口の悪化を防ぎます。

添加物：無水ケイ酸、カルボキシビニルポリマー、ハードファット

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない30℃以下の涼しい所に保管してください。




(2)小児の手のとどかない所に保管してください。




(3)保管する場合は、図のように坐剤の先を下に向けて外箱に入れ、外箱のマークに従って立てて保管してください。



(4)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)



(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後はなるべくはやく使用してください。(品質保持のため)



治療のポイント



排便後は入浴するか、ぬるま湯で洗う等、肛門を常に清潔にしましょう。また、入浴は患部の血行を改善するので、毎日入浴よう心がけましょう。



アルコール類、刺激物(からし、わさび等)を多くとると、症状を悪化させることがあるので、なるべくひかえましょう。



便秘や下痢をしないよう心がけましょう。特に便秘の時には、煮た野菜や海藻類・果物等を多く食べ、便通をととのえましょう。



ずわり続ける等、同じ姿勢を長く続けると、肛門部がうっ血するため、症状を悪化させやすいので、時々体操や散歩等をして、体を動かしましょう。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いいたします。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室
電話 03-3985-1800
受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号