

使用に際し、この説明書を必ず読むこと。また、必要なとき読めるように大切に保管すること。

痔疾用外用薬

痔の痛み、出血、はれに

第2類医薬品

新コリミジン®坐剤

製品の特徴

新コリミジン坐剤は、痛み・はれ・出血・かゆみなどの痔の症状を効果的に抑えるステロイド剤に、炎症を抑え組織修復作用をもつリゾチーム塩酸塩、痛み・かゆみに効果のある成分、殺菌・消毒作用をもつ成分を配合した坐剤です。肛門内に挿入することにより、痔に伴う症状を緩和します。



使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

1. 次の人は使用しないこと。
 - 1) 本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 2) 患部が化膿している人。
2. 長期連用しないこと。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 1) 医師の治療を受けている人。
 - 2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 10日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能効果

きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和。

用法用量

次の1回量を1日1～3回 肛門内に挿入する。

年 令	1回量
成人(15才以上)	1個
15才未満	使用しないこと

(用法用量に関連する注意)

- (1) 本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用すること。また、硬すぎる場合には、軟らかくなった後に使用すること。
- (2) 肛門にのみ使用すること。

【坐剤の使用方法】




成分分量 1個（成人1回量）中

成 分	分量	はたらき
プレドニゾロン酢酸エステル	1mg	痛み、はれ、出血などの症状に効果的なステロイド剤です。
リゾチーム塩酸塩	30mg(力価)	はれなどの炎症を抑え、傷ついた組織を修復する作用があります。
リドカイン	60mg	局所麻酔作用でかゆみ、痛みを緩和します。
クロルヘキシジン塩酸塩	10mg	殺菌・消毒作用により、細菌の感染を防ぎ、はれを緩和します。
アラントイン	20mg	傷ついた組織を修復する作用があります。

添加物としてハードファットを含有する。

保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない30℃以下の涼しい所に保管すること。
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
4. 保管する場合は、図のように坐剤の先を下に向けて箱に入れ、箱のマークに従って立てて保管すること。
5. 表示の使用期限を過ぎたものは使用しないこと。



【問い合わせ先】

1. 購入した薬局・薬店
2. 日水製薬株式会社 お客様相談窓口 電話：03-3837-0987
受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時
(土・日・祝日を除く)



製造販売元
日水製薬株式会社
東京都台東区上野3-23-9

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html> ☎ 0120-149-931