

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

尿量減少、残尿感に

和漢薬製剤

**JJルモ剤**

第2類医薬品

ノルモ剤は和漢薬を配合し、各生薬のもつ利尿作用などが総合的に働いて利尿効果をたかめ、尿量が少ない方、尿が出にくい方、残尿感のある方などの症状に効果があります。

**⚠ 使用上の注意****相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊娠又は妊娠していると思われる人
  - (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感
3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

**【効能・効果】**

尿量が減少し、尿が出にくく、残尿感があるもの。

**【用法・用量】**

次の量を、1日3回食間に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
15才以上	1 5 丸	3回
11才以上15才未満	1 0 丸	
8才以上11才未満	7 丸	
8 才未満	服用しないこと	

### 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に服用させる場合は、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 食間とは食後2~3時間を持ちます。

### 【成 分・分 量】 1日量 (45丸) 中

ソウジュツ末 …… 0.4g キササゲ末 …… 0.4g ポウイ末 …… 0.2g  
タクシャ末 …… 0.3g チョレイ末 …… 0.3g モクツウ末 …… 0.3g  
ブクリヨウ末 …… 0.3g

添加物として炭酸Ca、パレイショデンプン、カルメロースNa、寒梅粉を含有します。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

### 【お問い合わせ先】

本製品のお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願いいたします。

天恵堂製薬株式会社 「お客様相談窓口」  
電話 0952-97-0036  
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 **天恵堂製薬株式会社**  
佐賀県佐賀市蓮池町蓮池234