

この説明文書はお薬とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

ビタミンE剤

# 新**スキビタE**ゴールド

第3類医薬品

ビタミンEは動脈硬化などの原因として注目されている体内脂肪の変性（過酸化）を防ぐ働きをもっています。また、血管の動きが弱くなり血行が障害されておこる老年期のいろいろな症状を改善するビタミンとしても広く使用されています。

新**スキビタE**ゴールドはアルファ型トコフェロールを1カプセル中100mg含有し、のみやすくしたゼラチンカプセルです。

## 使用上の注意

### 相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- | 関係部位 | 症状        |
|------|-----------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器  | 胃部不快感     |
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
便秘、下痢
  - 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 〔用法・用量〕

次の量を食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1カプセル	3回
15歳未満	服用しないでください。	

### <用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守してください。

(必ず裏面もお読みください)

## 【効能・効果】

○末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ

○更年期における次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ

○月経不順

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

○次の場合のビタミンEの補給：老年期

## 【成分・分量】

1日量（3カプセル）中

成分	分量	はたらき
トコフェロール酢酸エステル （ビタミンE）	300mg	血行を改善し、また動脈硬化の原因となる過酸化脂質の生成を防いで、肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ、更年期ののぼせ、月経不順を緩和します。

添加物：オリブ油、ゼラチン、D-ソルビトール、グリセリン、パラベン

## 【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。

(4)配置期限の過ぎた製品は服用しないでください。なお、配置期限内であっても開封後はなるべく早く服用してください。

本品についてのお問い合わせは、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

東亜薬品株式会社 お客様くすり相談室

〒939-3542 富山県富山市水橋開発277番10

電話：076-478-5580

受付時間：9:00～16:00（土、日、祝祭日を除く）

製造販売元 **TOA** 東亜薬品株式会社

富山県富山市水橋開発277番10