

〔使用上の注意〕 相談すること

1ヵ月位服用しても症状がよくなる
ない場合は服用を中止し、この製品を
持って医師、薬剤師又は登録販売者に
相談すること

〔用法・用量〕

成人(15才以上)1回1瓶(50mL)を
1日1~2回服用してください。

1日2回服用する場合は、服用間隔を
4時間以上おいてください。

○用法・用量を厳守してください。

○小児には服用させないでください。

〔効能〕

○次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・
関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足
のしびれ、便秘、眼精疲労○脚気「ただ
し、これらの症状について、1ヵ月ほど使
用しても改善がみられない場合は、医師
又は薬剤師に相談してください。」○次の
場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、
妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保
管してください。(2)小児の手の届かない
所に保管してください。(3)使用期限をす
ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元

小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中鷄1丁目139番地

お客様相談室 電話：0120-584-419

受付時間：10時~16時(土、日、祝日を除く)

つらい肩こり 眼精疲労 に飲んで効く

コンドロイチン
硫酸エステルNa

ビタミンB₁
B₂・B₆配合

アイン[®]ゴールド
内服液

〈飲みやすいリンゴ味〉

第3類医薬品

〔成分・分量〕 50mL中

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム
..... 450mg
チアミン硝酸物..... 10mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム
.....7.5mg
ピリドキシン塩酸塩..... 25mg
ニコチン酸アミド..... 30mg

(アルコール0.2mL以下)

添加物：カラメル、アル
コール、白糖、D-ソルビ
トール、クエン酸水和
物、安息香酸Na、パラ
ベン、香料

○本剤に配合されてい
るリボフラビンリン酸
エステルナトリウムに
より、尿が黄色くなるこ
とがあります。

副作用被害救済制度

☎0120-149-931