

【使用上の注意】相談すること

1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【用法・用量】

成人(15才以上)1回1瓶(50mL)を1日2回服用してください。

服用間隔を4時間以上おいてください。

○用法・用量を厳守してください。

○小児には服用させないでください。

【効能】

○次の諸症状の緩和:神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足

のしびれ、便秘、眼精疲労○脚気「ただし、これら

の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は

薬剤師に相談してください。」○次の場合のビタミンB<sub>1</sub>の補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中

病後の体力低下時

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

ガラス:瓶、金属:キャップ



パイルズ®  
内服液Si



肩こり  
眼精疲労 50mL



●コンドロイチン  
硫酸エステルナトリウム

●ビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>2</sub>・B<sub>6</sub>

第3類医薬品

製造販売元 小林薬品工業株式会社  
岐阜県岐阜市中郷1丁目139番地

お客様相談室 電話:0120-584-419  
受付時間:10時~16時(土、日、祝日を除く)

【成分・分量】 50mL中

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

..... 200mg

アスパラギン酸カリウム・マグネシウム

等量混合物 ..... 100mg

チアミン硝化物 ..... 10mg

リボフラビンリン酸エステルナトリウム

..... 2mg

ピリドキシン塩酸塩 ..... 25mg

ニコチン酸アミド ..... 30mg

(アルコール0.2mL以下)

添加物:カラメル、アルコール、白糖、D-

ソルビトール、クエン酸水和物、安息香

酸Na、パラベン、香料

○本剤に配合されているリボフラビンリン

酸エステルナトリウムにより、尿が黄色

くなることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)使用期限

をすぎた製品は服用しないでください。

使用期限

製造番号