

効能 ●次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労 ●脚気「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」 ●次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時 **用法・用量** 成人（15才以上）1回1瓶（50mL）を1日1～2回服用する。1日2回服用する場合は、服用間隔を4時間以上おくこと。 ●定められた用法・用量を守る。 ●小児には服用させないこと。

保管及び取り扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない、涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり、品質が変わる）。(4)開封後はただちに服用すること。(5)使用期限をすぎた製品は服用しないこと。

第3類医薬品
販売名：
ピップPCI

瓶：ガラス
キャップ：金属

SD.KK

パソコン・スマホを使う方に

眼精疲労・肩こりに

P!
ピップ

PCI

飲みやすいリンゴ味

第3類医薬品 50mL

使用上の注意【相談すること】 PC01

1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

成分・分量 50mL中

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム…450mg、チアミン硝酸物…10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム…7.5mg、ピリドキシン塩酸塩…25mg、ニコチン酸アミド…30mg（アルコール0.2mL以下）添加物：カラメル、アルコール、白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、安息香酸ナトリウム、パラベン、香料 ●本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがあります。

発売元

P! ピップ株式会社

大阪市中央区東船場2-1-36 〒540-0011
お客様相談室 ☎(06)6945-4427
土・日・祝日を除く10:00～17:00

<ピップ製品情報> ホームページ www.pip-club.com

製造販売元

小林薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市中橋1-139 〒500-8288

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用期限

製造番号