

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 (1) 服用後、次の症状があらわれた場合
 悪心・嘔吐、口内炎
 (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
 2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
 軟便、下痢

【成分・分量】1日量(90mL)中
 フルスルチアミン塩酸塩……………30mg
 リポフラビンリン酸エステルナトリウム… 6mg
 ピリドキシン塩酸塩……………30mg
 ニコチン酸アミド……………45mg
 加工大蒜……………150mg
 ビタミンB₁₂により尿が黄色になることがあります。
 添加物：白糖、ブドウ糖、ハチミツ、クエン酸水和物、
 塩化Na、L-グルタミン酸Na、メタリン酸Na、ホリン酸Na、リン酸二水素Na、安息香酸Na、香料

【効能・効果】

- 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
 - 脚気
- 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使



レイヨ-V[®]

神経痛・筋肉痛・関節痛・手足のしびれ

眼精疲労・腰痛
 肩こり・五十肩
 の緩和に



第3類
 医薬品

30mL

製造販売元

松田薬品工業株式会社

本社・工場 愛媛県松山市河野中須賀318
 電話 (089) 994-1333
 副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

● 次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日3回、1回1本(30mL)を服用してください。用法及び用量を守ってください。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

ガラス：瓶 金属：キャップ
 使用期限 製造番号

