

【使用上の注意】 ビタミンB1主薬製剤

相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

(2) 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。軟便、下痢

(3) 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能又は効果】

○次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
○脚気「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。」

○次の場合のビタミンB1の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

製造販売元 大和合同製薬株式会社

奈良県橿原市川西町632-1

お問い合わせ先 ☎0744-27-3325
AM9:00～PM5:00（土・日・祝日を除く）

ガラス：瓶 金属：キャップ

使用期限

製造番号

眼精疲労・肩こり・腰痛

コンドロイチン
ベンフォチアミン 配合

(ビタミンB1誘導体)

眼 肩 腰

神経痛・手足のしびれ・
肉体疲労時のビタミンB1補給

ツライ症状に1日1本

パス・ビタimin®EX

50mL

第3類医薬品

シトラス風味
柑橘系

販売名：パス・ビタiminEX

【成分及び分量】1日量（1本：50mL）中
ベンフォチアミン（ビタミンB1）……………138mg
リボフラビン（ビタミンB2）……………3mg
ピロキシシン塩酸塩（ビタミンB6）……………50mg
ニコチン酸アミド……………60mg
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム…200mg
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム…200mg
オキソアミジン末（加工大蒜）……………50mg
添加物：DL-リンゴ酸、クエン酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、香料、プロピレングリコール、安息香酸Na、ブチルパラベン、エドト酸Ca/2Na、バニリン、その他3成分（アルコール0.1mL以下）
●本剤に配合されているリボフラビンにより尿が黄色になることがあります。

【用法及び用量】

大人（15歳以上）1日1回1本（50mL）を服用してください。

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法及び用量を厳守してください。
- (2) 他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください。
- (3) 15歳未満は服用しないでください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 生薬エキスを配合しているため、沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振って服用してください。
- (6) 加温・冷凍はさけてください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931