

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

## ビタミンB<sub>1</sub>主薬製剤

第3類医薬品

# パピアセン・Hi

パピアセン・Hiは、ビタミンB<sub>1</sub>（フルスルチアミン塩酸塩）を主薬とし、ビタミンB<sub>2</sub>、  
ビタミンB<sub>6</sub>、ビタミンB<sub>12</sub>、コンドロイチン硫酸ナトリウムを配合した医薬品で

- 神経痛、関節痛、手足のしびれ、眼精疲労などの諸症状の緩和
- 肉体疲労時、病中病後の体力低下時のビタミンB<sub>1</sub>の補給  
などに効果をあらわします。



### 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に  
相談してください

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐、口内炎

(2)1 カ月位服用しても症状がよくなる場合

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見  
られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

軟便、下痢


#### 【効能・効果】

○次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、  
手足のしびれ、便秘、眼精疲労

○脚気

「ただし、これらの症状について、1 カ月ほど使用しても改善がみられない  
場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」


○次の場合のビタミンB<sub>1</sub>の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時



筋肉痛・関節痛



肩こり



ビタミンB<sub>1</sub>の補給

#### 【用法・用量】

次の量を、水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	1 カプセル	3回（朝、昼、晩）
15歳未満	服用しないでください	

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

裏面もよくお読みください。



**【成分・分量】**

1日量（3カプセル）中

成 分	分 量
コンドロイチン硫酸ナトリウム	900mg
フルスルチアミン塩酸塩 (ビタミンB <sub>1</sub> 誘導体)	25mg
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB <sub>6</sub> )	25mg
リボフラビン酪酸エステル (ビタミンB <sub>2</sub> )	10mg
シアノコバラミン (ビタミンB <sub>12</sub> )	0.06mg


添加物として、セルロース、部分アルファー化デンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、黄色5号、カラギーナン、ソルビタン脂肪酸エステルを含有する。

**〈成分に関連する注意〉**

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB<sub>2</sub>によるものです。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)配置期限の過ぎた製品は使用しないでください。

**■お問い合わせ先**

本品に関するお問い合わせは、お買い求め先、または下記にお問い合わせ申し上げます。

株式会社 廣貫堂 「お客様相談窓口」

電話番号：076-424-2259

受付時間：9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）

製造販売元



**株式会社 廣 貫 堂**

〒930-0055 富山市梅沢町2丁目9-1

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
 （独）医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
 電話 0120-149-931（フリーダイヤル）