

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

肌あれ、にきび、口内炎に

# DHC ビタミンW

ビタミン  
B<sub>6</sub>・B<sub>2</sub>  
配合

<ビタミンB<sub>6</sub>主薬製剤>

第3類医薬品

DHCビタミンWは、肌あれ、にきび、口内炎などに効果のあるビタミンB<sub>6</sub>を主薬とするお薬です。また、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時のビタミンB<sub>6</sub>の補給にもお使いいただけます。



## 使用上の注意



### 相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合。

## ■ 効能・効果

### ● 次の諸症状の緩和

肌あれ、にきび、口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、手足のしびれ  
「ただしこれらの症状について、1ヶ月ほど服用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

### ● 次の場合のビタミンB<sub>6</sub>の補給

妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

## ■ 用法・用量

次の量を、1日2回朝・夕に服用してください。

成人(15才以上) ……1回2錠  
7才以上15才未満 ……1回1錠  
7才未満は服用しないこと。

【用法・用量に関連する注意】

1. 用法・用量を厳守してください。
2. 7才以上15才未満の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## ■ 成分・分量

4錠(成人1日量)中

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| ビロキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )      | 100mg            |
| 酢酸d- $\alpha$ -トコフェロール(ビタミンE)      | 40mg             |
| チアミンジスルフィド(ビタミンB <sub>1</sub> 誘導体) | 5mg              |
| リボフラビン(ビタミンB <sub>2</sub> )        | 12mg             |
| ニコチン酸アミド                           | 40mg             |
| $\gamma$ -オリザノール                   | 10mg             |
| ヨクイニン乾燥エキス末                        | 150mg            |
|                                    | (ヨクイニンとして1950mg) |

添加物として、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、部分アルファー化デンプン、ケイ酸Ca、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、白糖、フマル酸、ステアリン酸、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ゼラチン、アラビアゴム、タルク、炭酸Ca、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、三酸化鉄、酸化チタン、カルナウバロウを含有します。

## ■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

医薬品  
相談室

tel. 03-3762-2581

受付時間 9:00~17:00(日・祝日をのぞく)

DHC

製造販売元

株式会社ディー・エイチ・シー

東京都港区南麻布2-7-1 ☎0120-333-906

DHCホームページ

パソコン <http://www.dhc.co.jp>  
携帯 <http://www.dhc.jp>