

ビタミンCの補給に

第3類医薬品

ビタミンC主薬製剤

シナルA[®]細粒 **シオノギ製薬**

ビタミンCは、細胞と細胞をつなぐ結合組織の主成分コラーゲンの生成を助け、毛細血管を丈夫にしたり、皮ふのメラニン色素に働いて、しみなどの色素沈着を緩和する働きをもつ大切なビタミンです。人は、体の中でビタミンCをつくることができないため、食物または医薬品などから毎日摂取することが必要です。

シナルA細粒は、ビタミンCとその働きを助けるビタミンB₂を含んだのみやすい細粒剤で、4包で2,000 mgのビタミンCが補給できます。

**使用上の注意** ……**相談すること**

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師または薬剤師にご相談下さい

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐、胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師にご相談下さい
下痢

…… **効能・効果** ……

○次の諸症状の緩和

しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

○次の場合の出血予防

歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師または歯科医師にご相談下さい。」

○次の場合のビタミンCの補給

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

…… 用法・用量 ……

次の量を朝食後および夕食後におのみ下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1~2包	2回
小児(7才以上15才未満)	1包	2回
乳幼児(7才未満)	服用させないこと	

- 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

…… 成分・分量 ……

シナールA細粒は、黄色の細粒剤で、4包(1.3g×4・成人1日量)中に次の成分を含有しています。

成 分	含 量(4包中)
アスコルビン酸(ビタミンC)	2,000 mg
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB ₂)	12 mg

添加物として 白糖、ブドウ糖、含水二酸化ケイ素、バニリン、プロピレングリコール、香料を含有しています。

- (1) 本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB₂が吸収利用され、その一部が尿中に排泄されるためで心配ありません。
- (2) 本剤の服用により、尿および大便の検査値に影響をおよぼすことがありますので、これらの検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせ下さい。

…… 保管および取扱い上の注意 ……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり、品質が変化します)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないで下さい。



…… お問い合わせ先 ……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。
塩野義製薬株式会社「医薬情報センター」
電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450
受付時間：9時～17時(土、日、祝日を除く)

「副作用被害救済制度」について
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

…… 包 装 ……

シナールA細粒：30包(1.3g×30)、60包(1.3g×60)

Ⓢ：登録商標

製造販売元

塩野義製薬株式会社
大阪府中央区道修町3丁目1番8号