

この添付文書は本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

第3類医薬品

ビタミンC主薬製剤

ビタミンC錠 NV

ビタミンCは、生理的に重要な働きをする水溶性のビタミンの1つです。人間においては、体内においてビタミンCを作ることができないため、食品や医薬品から摂取することが必要です。

ビタミンC錠NVは、6錠(1日量)中に2,000mgのビタミンCを含有した製品です。

ビタミンCのはたらき

1. 血管、骨、筋肉の形成に必要な、コラーゲンの生成を促進します。
2. メラニンの生成を抑制し、しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着をやわらげます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

- 次の場合のビタミンCの補給：
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期
- 次の諸症状の緩和：
しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：
歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど服用しても改善がみられない場合は、医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。」

【用法・用量】

次の量を食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	3回
7歳以上15歳未満	1錠	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 本剤は7歳未満の乳児・幼児・小児には服用させないでください。

【成分・分量】 1日量(6錠)中

ビタミンCとして	2000mg
〔アスコルビン酸	1000mg〕
〔L-アスコルビン酸ナトリウム	1124.79mg〕
リボフラビン(ビタミンB ₂)	4mg

添加物:ステアリン酸Mg、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース

〈成分・分量に関連する注意〉

- (1) 本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、これはビタミンB₂(リボフラビン)によるものですから心配ありません。
- (2) 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師にお知らせください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 水分が錠剤に付きますと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じたりすることがありますので、ぬれた手で触ったり、水滴を落としたりしないでください。
- (5) ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するために入れてありますので、キャップをあけた後は必ず捨ててください。
- (6) 箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。
- (7) 使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。

本剤をご使用になられて、何かお気付きの点がございましたら、下記までご連絡頂きますようお願い致します。

福地製薬株式会社

T E L : 0748-52-2323

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

発売元 福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

製造販売元 日本ビタミン化学株式会社

富山県富山市中大久保196-11