

ご使用の前に、この添付文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるように大切に保管して下さい。

第3類医薬品

リボフラビン酪酸エステル配合

デイトナC

ビタミンC主薬製剤

デイトナCはリボフラビン酪酸エステル(ビタミンB₂)を配合した黄色い錠剤のビタミンC主薬製剤です。デイトナCはしみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着を緩和し、また、出血傾向を改善する働きにより、毛細血管出血(鼻出血、歯肉出血)の予防に優れた効果をあらわします。デイトナCは肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期などの場合のビタミンCの需要が増大し、食事からの摂取が不十分な場合のビタミンCの補給に有効です。

特 徴

◇色素沈着の緩和に

ビタミンC(アスコルビン酸)はメラニン色素の生成を抑制することにより色素の沈着を緩和します。また、ビタミンB₂(リボフラビン酪酸エステル)を配合することにより、ビタミンCの日やけによる色素沈着緩和効果を増強する処方としております。

◇毛細血管出血(鼻出血、歯肉出血)の予防に

ビタミンCは細胞をつなぎ止めるコラーゲンの生成に関与しており、毛細血管抵抗性の増強や血液凝固時間の短縮効果などにより、出血傾向を改善します。

◇肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期のビタミンCの補給に

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

下痢

【効能・効果】

次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血

ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください。

次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

【成分・分量】

デイトナCは黄色の錠剤で、1日量(6錠)中に次の成分を配合しています。

アスコルビン酸末……………1,030.93mg

〔アスコルビン酸(ビタミンC)として……………1,000.00mg〕

L-アスコルビン酸ナトリウム……………1,124.79mg

〔アスコルビン酸(ビタミンC)として……………1,000.00mg〕

リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB₂ 酪酸エステル)……6.00mg

添加物として、トウモロコシデンプン、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポビドン、無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

〔用法・用量〕

下記の量を食後水又は温湯で服用してください。

年 令	1 回 量	1日服用回数
成 人（15才以上）	1～3錠	2 回
11才以上 15才未満	1～2錠	2 回
7才以上 11才未満	1 錠	2 回
7才未満	使用しないこと。	

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

本品に関するお問い合わせ

オール薬品工業株式会社 くすり相談室
〒661-0953 尼崎市東園田町2丁目106番地
TEL (06) 6491-6222
電話受付時間：月～金（祝・祭日を除く）
9：00～17：00

製造販売元  **オール薬品工業株式会社**
兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地