

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

しみ・そばかすなどに

販売名：ピタタイムC錠2000

ビタミンC製剤

ピタタイムC錠2000

特徴

ピタタイムC錠2000は1日にビタミンCを最大で2,000mgとれるビタミンC製剤です。ビタミンCには、しみ・そばかすの原因となるメラニンの生成を抑え、色素の沈着を緩和する働きがあります。

また、ビタミンCは細胞と細胞をつなぐたんぱく質であるコラーゲンの生成を促進し、毛細血管を強化し、歯ぐきからの出血や鼻出血を予防します。



使用上の注意



相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
消化器	悪心・嘔吐

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合。



2. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

下痢

効能・効果

- 次の諸症状の緩和：
しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：
歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンCの補給：
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期



▼裏面もお読みください

用法・用量

次の1回量を食後に服用してください。水またはお湯でかまずに服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	1～3錠	1日2回
11歳～14歳	1～2錠	
7歳～10歳	1錠	
7歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量 6錠中

はたらき	成分	分量
メラニンの生成を抑え、色素沈着を予防します。また、血管、骨、筋肉の形成に必要なコラーゲン生成を促進するので出血しにくくなります	アスコルビン酸(ビタミンC)として 〔アスコルビン酸 …………… 1,000mg〕 〔L-アスコルビン酸ナトリウム … 1,124.79mg〕	2,000mg
皮ふ・粘膜の健康を保ちます	酪酸リポフラビン (ビタミンB ₂ 酪酸エステル)	6mg

添加物：トウモロコシデンプン、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸Mg

<成分・分量に関連する注意>

- (1) 本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB₂が吸収され、その一部が尿中に排泄されるためで心配はありません。
- (2) 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。なお、本剤は吸湿しやすい錠剤ですから、服用のつどキャップをしっかりとめてください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 湿気により錠剤表面が変色することがありますので、ぬれた手で触れないでください。
- (5) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤破損防止用です。開封時に捨ててください。
- (6) 箱の「開封年月日」記入欄にビンを開封した日付を記入しておいてください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (8) ビンの中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

米田薬品株式会社 お客様相談窓口

電話 06-6562-7411 受付時間 10:00～17:00 (土、日、祝日を除く)



米田薬品株式会社
大阪市浪速区塩草3丁目2-2