

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

しみ・そばかすの緩和に

第3類  
医薬品

# ルキナシー1600

## LUKINAC 1600

### ビタミンC主薬製剤

ビタミンC（アスコルビン酸）は、重要な生理作用をもったビタミンの一つで、体内ではつくることが出来ないため、医薬品や食物から摂取する必要があります。ルキナシー1600は、ビタミンCとその作用を助け過酸化脂質の除去作用のあるリボフラビン酪酸エステルを配合した製剤で、ビタミンCの酸味をやわらげ、口の中でまるやかに溶ける服用しやすい顆粒剤です。

#### 使用上の注意



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること  
医師の治療を受けている人
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
  - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心 <sup>いせ</sup> ・嘔吐

注)「悪心」とは、胸がむかむかして、はきけをもよおすことです
  - 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること  
下痢

#### <効能・効果>

次の諸症状の緩和：

しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

次の場合の出血予防：

歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。」

次の場合のビタミンCの補給：

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

### <用法・用量>

次の量を1日3回、朝昼晩服用してください。

年 令	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1包	3回
11才以上15才未満	2/3包	
7才以上11才未満	1/2包	
3才以上7才未満	1/3包	
1才以上3才未満	1/4包	
1才未満	服用しないこと	

### 用法・用量に関連する注意

- ① 定められた用法・用量を厳守してください。
- ② 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- ③ 1才未満の乳児には使用しないでください。

### <成分・分量>

1日量（3包）中 1包2g

成 分	分 量
アスコルビン酸（ビタミンC）	700mg
L-アスコルビン酸ナトリウム（ビタミンC）（アスコルビン酸として900mg）	1012.4mg
リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB <sub>2</sub> ）	3mg

添加物：白糖、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、含水二酸化ケイ素、香料

### 成分・分量に関連する注意

1. ビタミンCは、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。従って、医師の治療を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。
2. ビタミンB<sub>2</sub>は、体内に吸収されその一部が尿中に排泄されるため、尿が黄色くなる場合があります。

### 保管及び取り扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
4. 1包を分割し、残りを服用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■本製品内容についてのお問い合わせ先  
おくすり相談室  
電 話：0120-419-111  
受付時間：10時から18時まで（土、日、祝日を除く）

発 売 元 新日本製薬 株式会社  
福岡市中央区赤坂1-14-22  
製造販売元 株式会社 新日本医薬  
福岡市博多区吉塚8-7-11

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 電話：0120-149-931