

〔成分〕1瓶(50mL)中  
ニンジン(人参)流エキス 0.6mL、イカリソウ流エキス 0.1mL、ハンピ(反鼻)チンキ 0.25mL、ローヤルゼリーチンキ 300mg、ビタミンB<sub>1</sub>硝酸塩 10mg、ビタミンB<sub>2</sub>リン酸エステル 2mg、ビタミンB<sub>6</sub> 5mg、ニコチン酸アミド 15mg、ビタミンE酢酸エステル 10mg、シクロ酢酸ジイソプロピルアミン(DADA) 12mg、タウリン 300mg、無水カフェイン 30mg(アルコール0.7mL以下)

添加物として、D-ソルビトール、白糖、アルコール、グリセリン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、安息香酸ベンジル、パラベン、エチルパニリン、カラメル、L-グルタミン酸Na、バニリン、香料を含有します。○本剤配合成分のビタミンB<sub>2</sub>リン酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。○本剤は生薬成分配合のため、まれに濁りを生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

〔効能・効果〕○滋養強壮○肉体疲労・食欲不振・病中病後・発熱性消耗性疾患・栄養障害・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、虚弱体質

〔用法・用量〕成人(15才以上)1日1回1瓶(50mL)を服用します。

製造販売元

**エスエス製薬株式会社**  
東京都中央区日本橋浜町2-12-4  
お客様相談室 ☎0120-028-193  
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)  
<http://www.ssp.co.jp/>

副作用被害救済制度

☎0120-149-931



和漢植物エキスin ロンペンD  
**RONPEN D**  
新陳代謝を考え、弱った体に栄養補給

第2類医薬品

〔使用上の注意〕 **相談すること** ⑪

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この瓶を持って医師又は薬剤師に相談すること(1)服用後、次の症状があらわれた場合。皮膚:発疹 消化器:胃部不快感(2)しばらく服用しても症状がよくなる場合。2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること 軟便、下痢  
〔保管・取扱い上の注意〕(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管のこと。(2)小児の手の届かない所に保管のこと。(3)使用期限をすぎたものは服用しないこと。

50mL