

0162

A081014

ご使用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要時にそなえて大切に保管してください。

第3類医薬品

肌あれ、にきび、口内炎に

ベルメイト BB

ビタミンB₂B₆製剤、ビタミンC、L-システイン配合

ストレス、病気、お酒の飲み過ぎ、妊娠・授乳期、あるいは脂肪分の多い食事をした時には、ビタミンB群が不足しがちです。ビタミンB₂、ビタミンB₆が不足しますと、肌あれ、にきび等の皮膚疾患や口内炎等の症状が粘膜に現れやすくなります。

ビタミンB₂は皮膚の皮脂腺の働きを調節します。さらに、ビタミンB₆はビタミンB₂と働き合って皮膚の新陳代謝を活発にし、ニコチニ酸アミドと共に皮膚や粘膜の症状を正常化する働きがあります。さらに、ビタミンC、L-システインは皮膚の代謝に関与します。

ベルメイトBBは、ビタミンB₂、ビタミンB₆を主成分として、ニコチニ酸アミドやビオチンといった2種類のビタミンB群、さらに、ビタミンC、L-システインを配合した製品です。



△ [使用上の注意]

相談すること



1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師または薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 脳	発疹
消 化 器	恶心・嘔吐、胃部不快感、腹痛

(2) 1カ月位服用しても症状がよくならない場合

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。

口のかわき、下痢

(裏面もお読みください)

[成 分] 1日量(2錠) 中

ビタミンB ₂ (リボフラビン)	30mg
ビタミンB ₆ (ピリドキシン塩酸塩)	100mg
ビタミンC(アスコルビン酸)	100mg
ニコチン酸アミド	40mg
ビオチン	50μg
L-システイン	30mg

添加物として、セルロース、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、白糖、タルク、沈降炭酸カルシウム、アラビアゴム、ゼラチン、マクロゴール、酸化チタン、カルメロースナトリウム、カルナウバロウ、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

<成分に関する注意>

本剤の服用により尿が黄色くなることがあります、ビタミンB₂(リボフラビン)によるものですので心配ありません。

[効能・効果]

○次の諸症状の緩和:

口角炎、口唇炎、口内炎、舌炎、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、にきび、肌あれ

「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師に相談してください。」

○次の場合のビタミンB₂B₆の補給:

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

[用法・用量]

次の1回量を食後に水またはお湯でかまずに服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	1回
15歳未満の小児	服用しないこと	



<用法・用量に関する注意>

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

[保管および取扱い上の注意]

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れかえないでください。
- 瓶の中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、フタを開けた後はすぐしてください。
- 箱および瓶の「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入し、瓶をこの文書とともに箱に入れたまま保管してください。
- 一度開封した後は、品質保持の点から6ヶ月以内に服用してください。なお使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのご相談は、お客様相談窓口までお願い致します。

お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-023520

受付時間 平日9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

兵庫県尼崎市長洲本通2丁目8番27号

皇漢堂製薬株式会社