

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

腰痛・肩こり・眼精疲労に

販売名：ヘルビタ「フルスル錠」

ビタミンB1・B6・B12 製剤

ヘルビタフルスル錠

天然型ビタミンE配合

特徴

ヘルビタ「フルスル錠」は、ビタミンB1誘導体の塩酸フルスルチアミンを使ったビタミンB1 B6 B12製剤です。塩酸フルスルチアミンは体内で活性型ビタミンB1となり、他のビタミン群とともに、眼精疲労・神経痛・腰痛・肩こり・肉体疲労等の症状を緩和します。また、ビタミンEは血液循環を改善しますので、肩こりや手足のしびれを緩和します。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

医師の治療を受けている人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、口内炎、胃部不快感

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合。



3. 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師又は薬剤師に相談してください

4. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

軟便・下痢、便秘

効能・効果

●次の諸症状の緩和：

神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、眼精疲労

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

●次の場合のビタミンB1 B6 B12 の補給：

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時



肩こり



腰痛



眼精疲労

▼裏面もお読みください

用法・用量

次の1回量を服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	1錠	1日2~3回
15歳未満	服用しないでください	

ただし、1日2回服用する場合は、朝晩、1日3回服用する場合は、朝昼晩、食後すぐに水またはお湯で、かまずに服用してください。

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守してください。

成分・分量 3錠中

塩酸フルスルチアミン(ビタミンB1誘導体).....109.16mg
(フルスルチアミンとして100mg)

塩酸ピリドキシン(ビタミンB6).....100mg

シアノコバラミン(ビタミンB12).....1,500 μ g

コハク酸d- α -トコフェロール(ビタミンE).....100mg

ガンマーオリザノール.....10mg

添加物：乳糖、クエン酸Na、クエン酸、タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、ゼラチン、マクロゴール、炭酸Ca、ケイ酸Ca、デキストリン、ステアリン酸Mg、セルロース、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、アラビアゴム、白糖、酸化チタン、カルメロースNa、リン酸リボフラビンNa、カルナウバロウ

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 湿気により錠剤表面が変色することがありますので、ぬれた手で触れないでください。
- (5) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤破損防止用です。開封時に捨ててください。
- (6) 箱の「開封年月日」記入欄にビンを開封した日付を記入しておいてください。
- (7) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は、服用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (8) ビンの中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

米田薬品株式会社 お客様相談窓口

電話 06-6562-7411 受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)



米田薬品株式会社
大阪市浪速区塩草3丁目2-2