

第2類医薬品

この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

保健ビタミン剤
L-システイン・カルシウム配合
〈有核錠〉

チオルシン

THIOLCIN

チオルシンは、健康維持に大切なカルシウム、L-システイン、ビタミン類を配合した保健剤です。発育期のお子さまや妊娠・授乳期の栄養補給、虚弱体質の改善などに役立ちます。

作用と特長

☆骨や歯の形成・維持に欠かすことのできないカルシウムとカルシウムの吸収に必要なビタミンD₂を配合しています。

☆円滑なエネルギー発生に必要なビタミンB₁・B₆・CとL-システインを配合していますから、発育期のお子さまや妊娠・授乳期などの場合の栄養補給に役立ちます。

☆配合成分の安定性を配慮した有核錠です。

⚠ 使用上の注意

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

医師の治療を受けている人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐

(2)1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

下痢

■ 効能・効果

成人（15才以上）の場合

○虚弱体質

○栄養障害・病後の体力低下・産前産後・発熱性消耗性疾患・肉体疲労などの場合の栄養補給、滋養強壮

小児（5才～14才）の場合

○虚弱体質

○小児の発育期・偏食児・栄養障害・病後の体力低下・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給、滋養強壮

■ 用法・用量

通常、次の1回量を、いずれも1日3回服用します。

年齢	成人(15才以上)	8才～14才	5才～7才	5才未満
1回量	3錠	2錠	1錠	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)本剤は、**かま**ずに服用してください。

■ 成分 9錠(成人1日量)中

外層部

リン酸水素カルシウム水和物	1,200mg
乳酸カルシウム水和物	300mg
エルゴカルシフェロール(ビタミンD ₂)	400 I.U.
チアミン硝酸塩(ビタミンB ₁ 硝酸塩)	3mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	3mg

核錠部

L-システイン	20mg
アスコルビン酸(ビタミンC)	60mg

添加物として、CMC、無水ケイ酸、セルロース、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール、ステアリン酸Mg、タルク、BHAを含有します。



■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)ビンのフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。
- (5)ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

■ お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

<http://www.ssp.co.jp/>