

販売名 イキビタンSP3000

〔使用上の注意〕

【相談すること】

しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔効能・効果〕

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

成人(15歳以上)

1回1瓶(100mL)1日1回服用してください。

- 15歳未満は服用しないでください。
- 用法・用量を厳守してください。

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

28A1

ガラス:瓶

金属:キャップ

第2類医薬品

ローヤルゼリー
コンドロイチン

牛黄
イノシトール

滋養強壮・栄養補給

タウリン配合

3000mg

100mL

株式会社 サプリ



Suppli

登録品目番号24-496

〔成分・分量〕1日量1瓶(100mL)中
インヨウカク流エキス0.15mL(インヨウカク150mgに相当)、ゴオウ浸出液5mg(ゴオウ0.5mgに相当)、ローヤルゼリーチンキ50mg(ローヤルゼリー50mgに相当)、チアミン硝酸化物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg、ピリドキシン塩酸塩5mg、ニコチン酸アミド30mg、無水カフェイン50mg、タウリン3000mg、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物200mg、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム120mg、イノシトール100mg
(アルコール0.2mL以下)

添加物として白糖、果糖ブドウ糖液糖、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、DL-リンゴ酸、カラメル、ポリリン酸Na、安息香酸Na、パラベン、pH調整剤、エタノール、グリセリン、プロピレングリコール、バニリン、香料を含有する。

- 本剤に含まれるビタミンB2により、尿が黄色になることがあります。
- 本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効に変わりありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
4. 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 株式会社廣貴堂
富山市梅沢町2丁目9-1
(お客様相談窓口) 電話076-424-2259

¥300+税

使用期限

製造記号

