

使用上の注意 相談すること

しばらく服用しても症状がよくなりな  
場合は服用を中止し、この製品を持  
つて医師、薬剤師又は登録販売者に  
相談してください。

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉體疲労・病  
中病後・食欲不振・栄養障害・発  
熱性消耗性疾患・産前産後などの  
場合の栄養補給

用法・用量

用法・用量を厳守してください

成人(15歳以上) 1日1回 1回1瓶(100mL)

15歳未満は服用しないでください

保管及び取扱い上の注意

1.直射日光の当たらない涼しい所に  
保管してください。2.小児の手のと  
どかない所に保管してください。3.  
他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり、品質が  
変わります)4.使用期限を過ぎた製  
品は使用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

発売元 株式会社 NYグローバル  
富山市東中野町1丁目1-1  
(お問い合わせ先)電話 076-424-5515

製造販売元 株式会社 廣貴堂  
富山市梅沢町2丁目9-1

ガラス：瓶、金属：キャップ 87A1

HapYcom

第2類医薬品

からだ全体がだるいときに



MERJOHN-DX

4000α

マージョンDX4000α

タウリン3000mg

アミノ酸類1000mg

3種類の  
生薬成分

100mL

成分・分量 1日量1瓶(100mL)中

インヨウカク流エキス0.1mL(インヨウカク100mgに相当)、  
ショウキョウエキス9.7mg(ショウキョウ100mgに相当)、ローヤ  
ルゼリーチンキ50mg(ローヤルゼリー50mgに相当)、チアミ  
ン硝酸化物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg、  
ピリドキシン塩酸塩5mg、ニコチン酸アミド30mg、無水カフェ  
イン50mg、タウリン3000mg、アスパラギン酸カリウム・マグ  
ネシウム等量混合物200mg、カルニチ  
ン塩化物60mg、グリシン240mg、L-リ  
シン塩酸塩300mg、L-アルギニン塩酸  
塩60mg、L-バリン35mg、L-ロイシ  
ン70mg、L-イソロイシン35mg

添加物：白糖、D-ソルビトール、果糖ブドウ  
糖液糖、デキストリン、シクロデキストリ  
ン、スクラロース、カラメル、クエン酸水和  
物、DL-リンゴ酸、ポリリン酸Na、安息香酸  
Na、パラベン、pH調整剤、エタノール、グ  
リセリン、プロピレングリコール、バニリン、  
エチルバニリン、トコフェロール、香料  
●本剤に含まれているリボフラビンリン  
酸エステルナトリウムにより、尿が黄色く  
なることがあります。●本剤は生薬成分  
を含むため、まれに沈殿を生じることが  
ありますが、薬効には変わりありません。

1瓶(100mL)あたり 80kcal  
※アミノ酸類(L-バリン/L-ロイシン/L-  
イソロイシン/L-アルギニン塩酸塩/ア  
スパラギン酸カリウム・マグネシウム等  
量混合物/カルニチン塩化物/L-リシン  
塩酸塩/グリシン)

使用  
期限

製造  
記号



4 954097 859521

MADE IN JAPAN