

# シナビック

(ビタミン含有保健薬)

## 第3類医薬品

### ⚠【使用上の注意】



### ■ 相談すること

しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

### 【用法・用量】

成人（15才以上）1回1本（30mL）を1日2回を限度として服用してください。  
ただし、服用間隔は4時間以上おいてください。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法・用量を厳守してください。

### 【成分・分量】 1本（30mL）中

リボフラビン 2.5mg、ピリドキシン塩酸塩 10mg、ニコチン酸アミド 20mg、タウリン 500mg、カンゾウ流エキス 200 $\mu$ L（原生薬換算量200mg）、ケイヒエキス 9mg（原生薬換算量200mg）、シヤクヤクエキス 15mg（原生薬換算量60mg）、ショウキョウ流エキス 400 $\mu$ L（原生薬換算量400mg）、タインウ流エキス 400 $\mu$ L（原生薬換算量400mg）  
（アルコール0.33mL以下）

添加物：酒石酸、DL-リンゴ酸、クエン酸Na、安息香酸Na、DL-アラニン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、白糖、還元麦芽糖水アメ、D-ソルビトール、カラメル、パラベン、香料

#### 〈成分・分量に関連する注意〉

本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 本品は生薬成分を含むため、沈殿することがありますが、薬効には支障がありません。よく振ってから服用してください。
- (5) 封をあけたら飲みきってください。封をあけたまま保存しないでください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

## ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22

お客様相談室 電話 045-593-2136

受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）

# 風邪



# 疲労時の栄養補給

発熱、体がだるい時

ノンカフェイン

芍薬

桂皮

甘草

5種類の生薬成分

大棗

生姜

タウリン

3種のビタミン



第3類医薬品 シナビック

## 第3類医薬品

販売名: **シナビック**  
(ビタミン含有保健薬)

### 使用上の注意

相談すること

しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 成分・分量 1本(30mL)中

リボフラビン2.5mg、ピリドキシン塩酸塩10mg、ニコチン酸アミド20mg、タウリン500mg、カンゾウ流エキス200μL(原生薬換算量200mg)、ケイヒエキス9mg(原生薬換算量200mg)、シャクヤクエキス15mg(原生薬換算量60mg)、ショウキョウ流エキス400μL(原生薬換算量400mg)、タイソウ流エキス400μL(原生薬換算量400mg)、アルコール0.33mL以下  
添加物: 酒石酸、DL-リンゴ酸、クエン酸Na、安息香酸Na、DL-アラニン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、白糖、還元麦芽糖水アメ、D-ソルビトール、カラメル、パラベン、香料  
<成分・分量に関連する注意>  
本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。

### 効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

### 用法・用量

次の量を1日2回を限度として服用してください。ただし、服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1本	2回
15才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>  
定められた用法・用量を厳守してください。

### 保管及び取扱い上の注意

1.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。2.小児の手の届かない所に保管してください。3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)4.本剤は生薬成分を含むため、沈殿することがありますが、薬効には支障ありません。よく振ってから服用してください。5.封をあけたら飲みきってください。封をあけたまま保存しないでください。6.使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

ジェービーエス製薬株式会社

製造販売元  
栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1  
発売元  
横浜市都筑区東山田4-42-22

お客様相談室

電話 045-593-2136

受付時間 9:00~17:00  
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度  
☎0120-149-931

必ず使用上の注意をよく読んでから正しくお使いください。