

肩こり・目の疲れ・腰痛に

第3類医薬品

ビタミンB₁主薬製剤(ジセチアミン塩酸塩水和物・天然型ビタミンE配合)**ベリックスS[®]プラス** シオノギ製薬

ベリックスSプラスは、シオノギ研究所で開発されたビタミンB₁誘導体ジセチアミン塩酸塩水和物を主成分とし、これに神経・筋肉の円滑な働きに必要なビタミンB₂、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂と末梢の血行を高める天然型ビタミンE(コハク酸d- α -トコフェロール)を配合しています。

このため肩こり、眼精疲労、腰痛などの緩和に好適です。



使用上の注意……

相談すること



- 次の人は服用前に医師または薬剤師にご相談下さい
医師の治療を受けている人
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談下さい
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感、悪心・嘔吐
 - 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
- 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師または薬剤師にご相談下さい
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師にご相談下さい
軟便、下痢

……効能・効果……

○次の諸症状の緩和

筋肉痛・関節痛(肩こり、五十肩、腰痛など)、神経痛、手足のしびれ、眼精疲労、便秘

○脚気

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師にご相談下さい。」

○次の場合のビタミンB₁の補給

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

……用法・用量……

次の量を朝食後または夕食後なるべく30分以内に、水またはぬるま湯でおのみ下さい。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人(15才以上)	1～2錠	1回
小児(7才以上15才未満)	1錠	1回
乳幼児(7才未満)	服用させないこと	

●定められた用法・用量を厳守して下さい。

●小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

……成分・分量……

ベリックスSプラスは、うすいだい色の楕円形フィルムコーティング錠で、2錠（成人1日量）中に次の成分を含有しています。


成分	含量(2錠中)
ジセチアミン塩酸塩水和物(ビタミンB ₁ 誘導体)	120mg
リボフラビン(ビタミンB ₂)	10mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	50mg
シアノコバラミン(ビタミンB ₁₂)	60μg
コハク酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE)	100mg

添加物として、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、含水二酸化ケイ素、ヒプロメロース、白糖、酸化チタン、黄色三酸化鉄、三酸化鉄、タルク、カルナバロウを含有しています。

●本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB₂が吸収利用され、その一部が尿中に排泄されるため心配ありません。

……保管および取扱い上の注意……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管して下さい。(ピンのフタの閉め方が不十分な場合、湿気などの影響で薬が変質することがありますので、服用のつどフタをよく閉めて下さい)
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変化します)
- (4) ピンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防ぐためのものですから、ご使用のはじめに必ず捨てして下さい。
- (5) ピンの中に乾燥剤が入っています。服用しないで下さい。
- (6) 水分が錠剤に付くと、表面のコーティングの一部が溶けることがありますので、誤って水滴をおとしたり、ぬれた手で触れないようにして下さい。
- (7) 一度開封した後は、品質保持の点から、6か月以内にご使用下さい。
- (8) 使用期限をすぎた製品は、服用しないで下さい。



……日常の心がけ(肩こりの場合)……

<p>■適度な運動 (体操など)</p>	<p>■入浴(保温), マッサージ</p>	<p>■休養・睡眠 (過労をさける)</p>	<p>■栄養のバランス</p>
--------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------

……お問い合わせ先……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。
 塩野義製薬株式会社「医薬情報センター」
 電話：大阪 06-6209-6948, 東京 03-3406-8450
 受付時間：9時～17時(土、日、祝日を除く)

「副作用被害救済制度」について
 (独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

……包装……

ベリックスSプラス：54錠、110錠、160錠

®：登録商標

製造販売元

塩野義製薬株式会社
 大阪市中央区道修町3丁目1番8号