

滋養強壮・栄養補給

リポビタミンゴールド 第2類医薬品**【使用上の注意】****相談すること**

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合。
 - 皮ふ：発疹／消化器：胃部不快感
 - (2)しばらく服用しても症状がよくなる場合。
2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
 - 下痢

【効能】

☆肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給 ☆滋養強壮 ☆虚弱体質

【用法・用量】

大人（15才以上）1日1回1本（50mL）を服用してください。

※15才未満は服用しないでください。

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

【成分】 1本（50mL）中

タウリン	1500mg
ローヤルゼリー	200mg
ニンジンエキス	42mg（ニンジン600mgに相当）
ロクジョウチンキ	0.05mL（鹿茸13.9mgに相当）
ゴオウ抽出液	100mg（ゴオウ1mgに相当）
チアミン硝化物（V.B ₁ ）	5mg
リポフラビンリン酸エステルナトリウム（V.B ₂ ）	2.5mg
ピリドキシン塩酸塩（V.B ₆ ）	5mg
ニコチン酸アミド	20mg
イノシトール	100mg
無水カフェイン	40mg

添加物：白糖、D-ソルビトール、安息香酸 Na、クエン酸、クエン酸 Na、香料、プロピレングリコール、アルコール、グリセリン、バニリン（アルコール0.2mL以下）

【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミンB₂によるもので、ご心配ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

大正製薬(株) お客様119番室
電話 03-3985-1800

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931



大正製薬株式会社²¹
東京都豊島区高田3丁目24番1号

—本文は、直接ラベルに記載されている事項です—