

服用に際して、ラベルの説明文をよくお読みください。

第3類医薬品

滋養強壯剤

チオビタ® ドリンクアイピタス ゼロ

[使用上の注意]

相談すること

1. 服用後、皮膚に発疹があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
2. 服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

[効能・効果]

- 滋養強壯 ● 虚弱体質 ● 肉体疲労 ・ 病中病後 ・ 食欲不振 ・ 栄養障害 ・ 発熱性消耗性疾患 ・ 産前産後などの場合の栄養補給

[用法・用量]

成人（15歳以上）1日1回1本（100mL）を服用して下さい。

- 小児（15歳未満）は服用しないで下さい。
- 用法・用量を守って下さい。

[成分（1本100mL中）]

タウリン1000mg、イノシトール50mg、ニコチン酸アミド20mg、

チアミン硝化物（ビタミンB₁）10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム

（ビタミンB₂）15mg、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆）50mg、カルニチン塩化物120mg、

添加物：エリスリトール、アセスルファムK、スクラロース、クエン酸、クエン酸Na、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、バニリン、エチルバニリン、クエン酸トリエチル、サリチル酸メチル、オイゲノール、香料

- 本剤に配合されているビタミンB₂により、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。

[保管及び取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります）。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

包 装

100mL瓶入り

- 上記の内容はラベルに表示しております。

副作用被害救済制度の問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

TEL 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元

大鵬薬品工業株式会社

東京都千代田区神田錦町1-27

お客様相談室 TEL. 0120-4527-66

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

<https://www.taiho.co.jp/>



®：登録商標

服用に際してはラベルをよく読むこと

△【使用上の注意】 相談すること

1. 服用後、皮膚に発疹があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。2. 服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。【効能・効果】

○肉體疲勞・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給【用法・用量】成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用して下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守って下さい。

100mL

ガラス：瓶
金属：キャップ



糖類 ゼロ カフェイン ゼロ

TIOVITA

販売名：チオビタドリンクアイビタスゼロ

7kcal

第3類医薬品

(成分(1本100mL中)) タウリン1000mg、イノシトール50mg、ニコチン酸アミド20mg、チアミン硝酸塩(ビタミンB1)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)15mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)50mg、カルシウム塩化物120mg 添加物：エリスリトール、アセスルファムK、スクラロース、クエン酸、クエン酸Na、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、バニリン、エチルバニリン、クエン酸トリエチル、サリチル酸メチル、オイゲノール、香料 ●本剤に配合されているビタミンB2により、尿が黄色になることがあります。心配ありません。【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

製造販売元



大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

®:登録商標 L1902

副作用救済制度 TEL 0120-149-931

使用期限 製造番号