

イソビタンV²

成分・分量 1日量1本(100mL)中
チアミン硝酸物10mg、リボフラビン
リン酸エステルナトリウム3mg、ピリ
ドキシン塩酸塩50mg、ニコチン酸ア
ミド30mg、無水カフェイン50mg、L
-アルギニン塩酸塩40mg、L-アスパ
ラギン酸マグネシウム・カリウム
1000mg、ローヤルゼリー50mg
添加物：白糖、D-ソルビトール、dl-リ
ンゴ酸、クエン酸水和物、安息香酸
Na、エドト酸Ca/2Na、香料

●本剤に配合されているリボフラビ
ンリン酸エステルナトリウムにより、
尿が黄色になることがある。

用法・用量 成人(15歳以上)1日
1回1本(100mL)を服用する。

●用法及び用量を厳守すること。

●本剤は、まれに沈殿を生じることが
ある。よく振って服用すること。

効能・効果 滋養強壮、虚弱体質、
肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障
害・発熱性消耗性疾患・産前産後など
の場合の栄養補給

副作用被害救済制度

電話：0120-149-931

金属：キャップ ガラス：瓶 KL04

〈お客様相談室〉06-6203-5151

受付時間10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

¥200+税

100mL

肉体疲労時の栄養補給
ローヤルゼリー配合

イソビタン
V²

第3類医薬品

使用上の注意

相談すること 1.服用後、次の症状があら
われた場合は副作用の可能性があるので、
直ちに服用を中止し、この製品を持って医
師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感、下痢

2.しばらく服用しても症状がよくなるい場
合は服用を中止し、この製品を
持って医師、薬剤師又は登録販
売者に相談すること

**保管及び取扱
い上の注意**

(1)直射日光の当
たらぬ涼しい所
に保管すること。
(2)小児の手の届
かない所に保管す
ること。(3)他の
容器に入れ替えな
いこと(誤用の原
因になったり品質
が変わる。)(4)
使用期限を過ぎ
た製品は服用しな
いこと。(5)加温、
冷凍はさけること。



使用期限

製造番号