

販売名：イソビタンZ3000

[成分・分量] 1日量1本(100mL)中
チアミン硝酸塩10mg、リポフラ
ビンリン酸エステルナトリウム
3mg、ピリドキシン塩酸塩
50mg、ニコチン酸アミド20mg、
無水カフェイン50mg、L-アル
ギニン塩酸塩40mg、タウリン
3000mg、ローヤルゼリー抽出
液200mg(ローヤルゼリー
200mgに相当) 添加物：白糖、
D-ソルビトール、DL-リンゴ酸、
クエン酸水和物、安息香酸Na、
カラメル、マクロゴール、メタリ
ン酸Na、エタノール、香料、バ
ニリン、プロピレングリコール
〔アルコール0.3mL以下〕

●本剤に配合されているリポフラ
ビンリン酸エステルナトリウムに
より、尿が黄色になることがある。

[用法・用量]

成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)
を服用する。

●用法及び用量を厳守すること。
●本剤は、まれに沈殿を生じるこ
とがある。よく振って服用するこ
と。

ガラス：瓶 金属：キャップ

¥300+税

AL04

<お客様相談室>06-6203-5151
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造 田村薬品工業株式会社
販売元 奈良県御所市西寺田50

滋養強壮・虚弱体質 肉体疲労時の栄養補給に イソビタンZ3000



[使用上の注意] **相談すること**

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副
作用の可能性があるので、直ちに服用を
中止し、この製品を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感、下痢

2. しばらく服用しても症状が
よくなる場合は服用を
中止し、この製品を持って
医師、薬剤師又は登録販
売者に相談すること

[効能・効果]

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・
病中病後・食欲不振・栄養障害・
発熱性消耗性疾患・産前産後
などの場合の栄養補給

[保管及び取扱い上の注意]

(1)直射日光の当たらない涼しい
所に保管すること。(2)小児の
手の届かない所に保管するこ
と。(3)他の容器に入れ替えない
こと(誤用の原因になったり品
質が変わる。)(4)使用期限を
過ぎた製品は服用しないこと。
(5)加温、冷凍は避けること。

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

使用期限

製造番号

第3類医薬品 100mL

