

4 987450 000629

【使用上の注意】

(相談すること) 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
○皮膚:発疹・発赤、かゆみ
2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
(2)小児の手の届かない所に保管すること

(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがある)

(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

【用法・用量】成人1回1瓶(100mL)を1日1回服用してください。●定められた用法、用量を厳守してください。●本剤は生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元



東和製薬株式会社

和歌山県紀の川市貴志川町丸栖1229番地
電話 0120-108871(土、日、祝日を除く)

滋養強壯、肉体疲労時の栄養補給

リッチミン[®]
スーパー

RICHMIN
SUPER

Nutrition and invigoration, Nutrient supplement
in case of physical fatigue

100mL

第2類医薬品

リッチミンスーパー

【効能・効果】

- 滋養強壯
- 虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

使用
期限

Lot.

【成分・分量】1日量1瓶(100mL)中
チアミン硝酸物(ビタミンB₁)10mg・リボフラビン(ビタミンB₂)5mg・ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)10mg・ニコチン酸アミド50mg・無水カフェイン50mg・イノシトール100mg・タウリン2,000mg・L-アスパラギン酸ナトリウム150mg・ゴウウチンキ0.25mL・イカリソウエキス100mg・ロクジョウチンキ0.15mL・ニンジンエキス90mg
添加剤:白糖、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、DL-リンゴ酸、L-グルタミン酸Na、安息香酸Na、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、香料 含有(アルコール0.3mL以下)

●本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色くなることがあります。

ガラス:瓶 金属:キャップ

KT05