

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

人参・ゴオウ・にんにく配合

滋養強壮・虚弱体質

滋養強壮保健剤

オキシピン®

第2類医薬品

オキシピンは滋養強壮に用いられるニンジンエキス、ゴオウ(牛黄)チンキ、ニンニクエキス、ハツ目鱧抽出液を処方し、更に肝臓加水分解物やビタミンB₁・B₆・B₁₂を配合した液剤で、滋養強壮や虚弱体質に、あるいは肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給に効果を発揮します。

△ 使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給
- 滋養強壮
- 虚弱体質

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気のない涼しい所に密栓して立てて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。

用法・用量

次の用法・用量を守り、服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人(15歳以上) | 1mL | 2回 |
| 15歳未満の小児 | 服用しないこと | |

計量には1回量を量り得る添付の容器をご使用ください。

成分・分量

オキシピンは、2mL中に下記の成分・分量を含有します。

ニンジンエキス54mg(人参として600mg)
 ゴオウチンキ0.2mL(牛黄として2mg)
 ニンニクエキス1,000mg(ニンニクとして3,000mg)
 ハツ目鱧抽出液0.1mL(ハツ目鱧として7.1mg)
 肝臓加水分解物50mg
 チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB₁塩酸塩)20mg
 ビリドキシリン塩酸塩(ビタミンB₆) 5mg
 シアノコバラミン(ビタミンB₁₂) 2μg
 添加物として、D-ソルビトール、希塩酸、アルコール、安息香酸Na、パラベン、カラメルを含有します。
 〈成分・分量に関連する注意〉本剤には生薬成分が配合されていますので、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

お問い合わせ先

日本製薬工業株式会社 お客様相談室
 電話(0568)42-1234
 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
<http://www.sg-nsk.co.jp/>

製造販売元

日本製薬工業株式会社
 愛知県小牧市小木東一丁目186

®：登録商標