

71409
ロ-ヤルテストJG
 滋養強壯剤
 第2類医薬品

第2類医薬品

ロ-ヤルテストJG

滋養強壯剤

使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- | 関係部位 | 症状 |
|------|----------|
| 皮膚 | 発疹 |
| 消化器 | 胃部不快感、悪心 |
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。下痢、便秘
 3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる見込みがない場合は服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分・分量

1日量1瓶（50mL）中
 ロ-ヤルゼリー……………500mg
 オウセイエキス（黄精432.9mgに相当）…130mg
 ニンジンエキス（人参670mgに相当）…100mg
 インコウカクエキス（淫羊藿300mgに相当）…160mg
 トコフェロール酢酸エステル……………10mg
 ビリドキシン塩酸塩……………10mg
 タウリン……………1000mg
 無水カフェイン……………25mg
 （アルコール1.0mL以下）
 添加物として、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、白糖、グリシン、クエン酸水和物、dl-リンゴ酸、クエン酸Na水和物、フマル酸Na、安息香酸Na、ブチルパラベン、エチルアルコール、グリセリン、ハニリン、プロピレングリコール、香料を含有する。

効能・効果

滋養強壯、虚弱体質、肉体的疲労、病中病後、食欲不振、栄養障害、発熱性消耗性疾患、妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量

成人（15歳以上）1回1瓶（50mL）を1日1回服用する。
 15歳未満は服用しないでください。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わる。）
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

※ 本剤は生薬成分を配合した内服液ですので、まれに沈んでんを生じることがありますが、よく振ってから服用してください。

製造販売元
明治薬品株式会社
 富山県富山市三郷6番地
 お客様相談室 ☎0120-53-3451
 9:00~17:00（土、日、祝日、特定休日を除く）


紙：箱



C173

21-6-G

開封口



滋養強壯

**ロ-ヤル
 テストJG**

**ロ-ヤル
 テストJG**



**ロ-ヤルゼリー
 500mg**

ロ-ヤルゼリー

オウセイ

人 参

淫羊藿

ビタミンE

配合

使用期限

製造番号

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

第2類医薬品 50mL

第2類医薬品 50mL