【使用上の注意】
【してはいけないこと】
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
長期連用しないこと
【相談すること】
1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者。(3)次の症状のある人。むくみ (4)次の診断を受けた人。高血圧、腎臓病
2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮ふに次の異常な症状があらわれることがある。その場合は直ちに医師の診断を受けること。●急アルドステロン症、ミオパチー手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
3.1~2週間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
【保管及び取り扱い上の注意】
(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)。(4)使用期限の過ぎた製品は服用しないこと。
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931
使用期限

Lot No.

カゼなどで熱がある時や肉体疲労時の栄養補給、滋養強壮

ビタグルコンK

【用法・用量】
成人(15歳以上)1回1本(20mL)を1日3回服用する。●用法及び用量を厳守すること。
【効能・効果】
発熱性消耗性疾患・病中病後・肉体疲労・食欲不振・栄養障害・産前産後などの場合の栄養補給、虚弱体質、滋養強壮

製造販売元
KINYO 金陽製薬株式会社
奈良県五條市住川町1420番地
TEL 0747-22-3451

販売名:ビタグルコンK
【成分・分量】
1日量(60mL(20mL×3本))中
カンゾウエキス900mg(原生薬換算量3600mg)、ショウキョウエキス25mg(原生薬換算量300mg)、ケイヒ流エキス0.3mL(原生薬換算量300mg)、タウリン1500mg、リボフラビン3mg、ピリドキシン塩酸塩15mg、ニコチン酸アミド30mg、(アルコール含有0.2mL以下)、添加物として白糖、ブドウ糖果糖液糖、DL-アラニン、安息香酸Na、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、pH調整剤、アルコール、グリセリン、香料、プロピレングリコールを含有します。
●本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがあります。
●生薬成分を含むため、まれに沈着を生じることがありますが、薬効には支障ありません。

第2類医薬品 20mL
ガラス:ビン、金属:キャップ

4 987347 203898