

〔使用上の注意〕

【相談すること】

しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

●滋養強壮 ●虚弱体質 ●肉體疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用する。
・用法及び用量を厳守すること。

販売元
 **MIC** 株式会社 **新日配薬品**
Medical Information Coordinator
山口県下関市新堀田北町2番16号
TEL 083-253-1807

製造販売元
 **金陽製薬株式会社**
奈良県五條市住川町1420番地
TEL 0747-22-3451

ガラス：ビン
金属：キャップ

¥300+税

第2類医薬品

タギルEX 3000

滋養強壮、 肉體疲労時の栄養補給

タウリン

インヨウカク

セイヨウサンザシ

100mL

販売名：タギルEX3000 **第2類医薬品**

〔成分・分量〕 1日量(1本：100mL)中

タウリン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3000mg
イカリソウエキス・・・・・・30mg(インヨウカク300mgに相当)
セイヨウサンザシエキス・・20mg(セイヨウサンザシ140mgに相当)
チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB₁)・・・・・・・・10mg
リボフラビン(ビタミンB₂)・・・・・・・・・・・・2mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)・・・・・・・・6mg
ニコチン酸アミド・・・・・・・・・・・・・・20mg
無水カフェイン・・・・・・・・・・・・・・50mg

(アルコール含有0.2mL以下)

添加物としてクエン酸、DL-リンゴ酸、グルコノラクトン、L-グルタミン酸Na、DL-アラニン、白糖、ブドウ糖果糖液糖、D-ソルビトール、安息香酸Na、パラベン、アルコール、香料、プロピルグリコール、パロリン、エチルパロリン、グリセリン、L-メントールを含有します。

・本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがあります。
・生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には支障ありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限の過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用期限

Lot No.