

ロイヤルゼリービタミン

第3類医薬品

内服液

滋養強壮・虚弱体質
肉体疲労時の栄養補給

30mL

使用上の注意 相談すること

しばらく服用しても症状がよくなる
ない場合は服用を中止し、この製品を持
って医師、薬剤師又は登録販売者に相
談してください。

効能・効果

○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・病中病
後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・
産前産後などの場合の栄養補給

用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1本(30mL)を服用して
ください。

定められた用法・用量をお守りください。

製造販売元



大生堂薬品工業株式会社

岐阜市六条大溝3丁目3番17号

成分・分量 本品1本(30mL)中

タウリン	200mg	ニコチン酸アミド	25mg
ローヤルゼリーチンキ	0.25mL	パントテン酸カルシウム	20mg
(ローヤルゼリー100mgに相当)		無水カフェイン	50mg
ゴオウチンキ	0.2mL	(アルコール0.5mL以下)	
(ゴオウ2mgに相当)		添加物として白糖、クエン酸、 DL-リンゴ酸、安息香酸Na、パ ラベン、プロピレングリコール、 香料を含有します。	
オウセイ流エキス	0.24mL		
(オウセイ240mgに相当)			
チアミン硝化物	10mg		
リポフラビン	2mg		
ピリドキシン塩酸塩	10mg		

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になっ
たり品質が変わります。)

○使用期限

○製造番号

栄養強壯剤

第3類医薬品

ローヤルゼリー、ゴオウ、オウセイ配合

ロイヤルゼラビタン



滋養強壯・虚弱体質・肉体疲労時の栄養補給

使用上の注意 **相談すること**

しばらく服用しても症状がよくなる場合
は服用を中止し、この製品を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

○滋養強壯○虚弱体質○肉体疲労・病中
病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性
疾患・産前産後などの場合の栄養補給

用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1本(30mL)を
服用します。
定められた用法・用量をお守りください。

お客様相談室:058-271-9481

製造販売元



大生堂薬品工業株式会社

岐阜市六条大溝3丁目3番17号

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

成分・分量 本品1本(30mL)中

タウリン200mg、ローヤルゼリーチンキ0.25mL(ローヤルゼリー
100mgに相当)、ゴオウチンキ0.2mL(ゴオウ2mgに相当)、オウセ
イ流エキス0.24mL(オウセイ240mgに相当)、チアミン硝化物10mg、
リボフラビン2mg、ピロキシリン塩酸塩10mg、ニコチン酸アミド25mg、
パントテン酸カルシウム20mg、無水カフェイン50mg
(アルコール0.5mL以下)

添加物として白糖、クエン酸、DL-リンゴ酸、安息香酸Na、
バラベン、プロピレングリコール、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わります。)

○使用期限

○製造番号

¥400

(税別)

ロイヤルゼリービタミン

第3類医薬品

内服液

滋養強壮・虚弱体質
肉体疲労時の栄養補給

禁注射

30mL

使用上の注意 相談すること

しばらく服用しても症状がよくなる
場合は服用を中止し、この製品を持
って医師、薬剤師又は登録販売者に相
談してください。

効能・効果

○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・病中病
後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・
産前産後などの場合の栄養補給

用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1本(30mL)を服用して
ください。定められた用法・用量をお守りください。
内服にのみ使用してください。

製造販売元



大生堂薬品工業株式会社

岐阜市六条大溝3丁目3番17号

成分・分量 本品1本(30mL)中

タウリン	200mg	ニコチン酸アミド	25mg
ローヤルゼリーチンキ	0.25mL	パントテン酸カルシウム	20mg
(ローヤルゼリー100mgに相当)		無水カフェイン	50mg
ゴオウチンキ	0.2mL	(アルコール0.5mL以下)	
(ゴオウ2mgに相当)		添加物として白糖、クエン酸、 DL-リンゴ酸、安息香酸Na、パ ラベン、プロピレングリコール、 香料を含有します。	
オウセイ流エキス	0.24mL		
(オウセイ240mgに相当)			
チアミン硝化物	10mg		
リポフラビン	2mg		
ピリドキシン塩酸塩	10mg		

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になっ
たり品質が変わります。)

○使用期限

○製造番号