

## ⚠【使用上の注意】

### ■ **相談すること**

次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 本剤の服用により、発疹等の症状があらわれた場合
- (2) しばらく服用しても症状がよくなる場合

**【効能・効果】** ○滋養強壮 ○虚弱体質 ○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

**【用法・用量】** 成人(15歳以上)1日1回1本(30mL)を服用してください。

●用法及び用量を厳守してください。

**【成分・分量】** 1本(30mL)中  
ロクジョウチンキ(鹿茸)……………0.1mL  
(ロクジョウ0.03gに相当)  
ゴオウチンキ(牛黄)……………0.2mL  
(ゴオウ0.002gに相当)  
エゾウコギ流エキス……………0.2mL  
(エゾウコギ0.2gに相当)  
イカリソウ流エキス(淫羊藿) 0.2mL  
(イカリソウ0.2gに相当)  
サンシュユ流エキス……………0.2mL  
(サンシュユ0.2gに相当)  
カシュウチンキ(何首烏)……………0.3mL  
(カシュウ0.1gに相当)  
アミノエチルスルホン酸(タウリン) 1,000mg  
カフェイン……………50mg  
リン酸リボフラビンナトリウム(ビタミンB<sub>2</sub>) 10mg  
塩酸ピリドキシン(ビタミンB<sub>6</sub>) ……5mg  
ニコチン酸アミド……………50mg  
添加物としてクエン酸、DL-リンゴ酸、カラメル、D-ソルビトール、白糖、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、香料、グリセリンを含有する。(アルコール含有1mL以下)

●本剤の服用により、尿が黄色になることがあります。これは本剤中のビタミンB<sub>2</sub>によるもので、ご心配ありません。

### **【保管及び取扱い上の注意】**

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 本剤は、生薬成分を配合していますので沈殿を生じることがありますが、薬効には影響がありませんので、よくふってから服用してください。
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

第2類医薬品

30mL

滋養強壯剤

# サチキング

ロクジョウ・ゴオウチンキ、  
エゾウコギ流エキス配合



発売元 **株式会社 カイゲン**

大阪府中央区道修町2丁目5番14号  
【お問い合わせ先】 06-6202-8911

製造販売元 **大洋薬品工業株式会社**

大阪府柏原市清州2丁目2番15号