

【成分・分量】 1本(50mL)中
リボフラビン(ビタミンB2)ナトリウム塩(ビタミンB2)
10mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)
150mg、ニコチン酸アミド(ビタミンB3)
150mg、チアミン(ビタミンB1)10mg、コリン
150mg (コリンとして1950mg)添加として
クエン酸、α-リノレン酸、果糖、ブドウ糖、
1-ランタン、プロピレングリコール、エタノール、
香料を含有する。

【効能・効果】 ①次の諸症状の緩和肌あれ、
にきび、口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎、皮膚炎、湿疹、
かぶれ、ただれ、目の充血、目のかゆみ、赤鼻「ただし、
これらの症状について、1か月ほど使用しても改善
が見られない場合は、医師又は薬剤師に相談し
てください。」 ②次の場合のビタミンB₂の補給
肉体的疲労、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】 成人(15歳以上)1回1本
(50mL)を1日1回服用してください。(15歳未満
は服用しないでください。)●用法・用量を遵守すること
●本剤は生薬成分を配合していますので、虫薬
を生じることがあります。よく振ってから服用
してください。

発売元 奥田製薬株式会社
大阪府北区天満1丁目4番5号

お薬相談 06-6351-2100(代表)
(9:00~17:00 土日祝日を除く)

総販売元 中外製薬生産株式会社
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

ガラス:ピン 金属:キャップ

10 副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

MediSone

B₂B₆

ビタミンB₂
ビタミンB₆
ヨクイニンエキス配合

肌あれ・にきび
口内炎に

パッションードリンク

第3類医薬品 50mL

〈使用上の注意〉

【相談すること】

1. 服用後、次の症状があら
われた場合は副作用の
可能性があるため、直
ちに服用を中止し、この
薬品を持って医師、薬
剤師又は登録販売者に
相談すること。○皮膚
発疹・発赤、かゆみ、
○消化器:胃部不快
感、胃部膨満感、食
欲不振、嘔吐、嘔
吐、下痢、便秘、
2. 服用後、次の症状があら
われた場合は、このよ
うな症状の持続又は
増強がみられた場合
には、服用を中止し、
この薬品を持って医
師、薬剤師又は登録
販売者に相談すること。
○下痢、3. 1か月位
服用しても症状がよ
くならない場合は服
用を中止し、この薬
品を持って医師、薬
剤師又は登録販売者
に相談すること。

○保存及び取扱い上の注意 (1) 直射日光
の当たらない涼しい所に保管すること。(2)
小児の手の届かない所に保管すること。(3)
他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因
になったり品質が変わる。) (4) 使用期限を
過ぎた製品は服用しないこと。

*本剤の服用により尿が黄色くなること
がありますが、ビタミンB₂のナトリウム塩
によるものですので心配ありません。

製造番号

使用期限

4 571292 674584

