

△【使用上の注意】 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 ●滋養強壮 ●虚弱体質 ●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】 成人(15歳以上)1日1回1本を服用してください。

○用法・用量を厳守すること

【成分・分量】 1本(50mL)中 チアミン硝酸塩(ビタミンB1硝酸塩)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)15mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)20mg、ニコチン酸アミド40mg、タウリン1000mg、L-バリン80mg、L-ロイシン160mg、L-イソロイシン80mg、ヨクイニンエキス150mg(ヨクイニンとして1950mg)、ローヤルゼリーチンキ300mg(ローヤルゼリーとして300mg)

添加物:クエン酸、クエン酸Na、dl-リンゴ酸、エリスリトール、アセスルファムK、スクラロース、パラベン、香料

O2TαELAJ

ハンカフェイン

1びん
6.5kcal

疲れた体に

ステラスBB
ローヤルα

+ 栄養補給に

ヨクイニン
ローヤルゼリー
タウリン・アミノ酸配合

第3類医薬品

製造販売元



中外医薬生産株式会社
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

販売名

ステラスBBローヤルα
【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

※本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

※本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、ビタミンB2リン酸エステルによるものですので心配ありません。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お客様相談室：0595-21-3200
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)