

アスリキ内服液

使用上の注意

【相談すること】

しばらく服用しても症状がよくなる場合は、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

重量増進、虚弱体質、肉体的疲労・肩中病後、胃腸障害、栄養障害、発熱性消耗性疾患、妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量

大人1日1回1本(30mL)服用

●用法・用量を守ってください。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

●生薬成分含有のため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効に影響はありません。よく振ってから服用してください。

発熱性消耗性疾患時の栄養補給



第3類医薬品

30mL

成分・分量 1日量(30mL)中

コオウテンキ …… 200μL
(精製コオウとして2mg)

ニンジンエキス …… 55mg
(脱水ニンジンとして0.5mg)

チアミン塩化物塩酸塩 …… 10mg

リポフラビン …… 2mg

ピリドキシン塩酸塩 …… 5mg

無水カフェイン …… 50mg

添加物としてクエン酸、クエン酸Na、dl-リンゴ酸、ブドウ糖、果糖液糖、白糖、D-ソルビトール、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、香料、カラメルを含有。
(アルコール0.3mL以下)

ガラス:瓶

金属:キャップ

萬金薬品工業株式会社
奈良県高市郡明日香村野口317

使用
期限

製造
番号