

第2類医薬品

販売名:新ロスミンK内服液

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
長期連用しないでください。

👤 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 高齢者。
(3) 次の症状のある人。むくみ
(4) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病
- 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診療を受けてください

偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
---------------------	---

- 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

米田薬品株式会社

大阪市浪速区塩草3丁目2-2

お客様相談窓口 電話 06-6562-7411
受付時間 10:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

[用法・用量]

次の1回量を服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人 (15歳以上)	1びん (30mL)	1日2回
15歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守してください。

[効能・効果]

- 肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
- 虚弱体質
- 滋養強壮

[成分・分量] 1びん(30mL)中

カンゾウエキス……………500mg(原生薬換算量 2,500mg)
コウジン乾燥エキス……………30mg(原生薬換算量 300mg)
タウリン……………1,000mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂)…5mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)……………25mg
ニコチン酸アミド……………15mg
カルニチン塩化物……………50mg

添加物：クエン酸水和物、炭酸水素Na、エタノール、安息香酸Na、パラベン、香料、白糖、黒砂糖、デキストリン

<成分・分量に関連する注意>

生薬成分を配合しているため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には影響ありませんので、よく振ってから服用してください。

[保管及び取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。