

強壯生薬配合

新インビタンW 内服液

30mL

黄斗

第3類医薬品

使用上の注意

相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感、下痢

2.しばらく服用しても症状がよくなりません場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分・分量 1日量1本(30mL)中
ゴウヨウ抽出液(ゴウヨウ2mgに相当)→100μL、
L-アスパラギン酸マグネシウム→500mg、L-
アスパラギン酸カルシウム→500mg、タウリン
→600mg、シアノコバラミン→10μg、10-ネ
テン酸カルシウム→30mg、ニコチン酸アミド
→30mg、ピリドキシン塩酸塩→5mg、チアミ
ン塩化塩→10mg、焦水カフェイン→50mg
添加物:甘味、バチオミン、クエン酸水化物、α-
リリン酸、安息香酸Na、D-ソルビトール、カラメル、エタノール、香料、エチルパラヒンクエン酸
Na水和物、グリセリン、バコリン、ブドウ糖液、
ブドウ糖、プロピレングリコール(アルコール
0.6mL以下)

用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1本(30mL)を服用する。●用法及び用量を厳守すること。●本剤は、まれに過敏を生じることがある。よく振って服用すること。

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体的疲労・病中病後、胃腸障害、栄養障害、発熱性消耗性疾患、産前産後などの場合の栄養補助。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)加温、冷凍はさけること。

副作用被害救済制度
電話:0120-149-931

(お客様相談室)06-6203-5151
受付時間:10:00~17:00(土、日、夜間を除く)

製造販売元

田村薬品工業株式会社
奈良県御所市西寺田50

¥400+税

AL03

使用
期限

製造
番号

金属:キャップ ガラス:瓶