

滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給

スーパービル・レッド

第3類医薬品

成分・分量
1本(30mL)中

タウリン 600mg
ニンジンエキス(原生薬換算333.3mg) 50mg
ゴオウ浸出液(原生薬換算1mg) 1,000mg
チアミン塩化物塩酸塩(V.B1) 5mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム(V.B2) 4mg

アスコルビン酸(V.C) 100mg
パンテノール 10mg
イノシトール 100mg
重酒石酸コリン 100mg
グルクロノラクトン 100mg

添加物としてL-グルタミン酸Na、クエン酸、白糖、コハク酸2Na、dl-リンゴ酸、D-ソルビトール液、パラベン、安息香酸、安息香酸Na、香料、エタノール、プロピレングリコール、グリセリン脂肪酸エステルを含有する。

用法・用量

成人(15才以上)1回1本(30mL)、1日3回食後に服用してください。

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・
発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

使用上の注意

相談すること 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 皮膚：発疹/消化器：胃部不快感、下痢
2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

取扱い上の注意

1.小児の手のとどかない所に保管してください。
2.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
まれに沈殿(生薬による)を生じることがありますが、
薬効には変わりありません。
ビタミンB₂が配合されていますので、尿が黄色くなることがあります。



発売元

日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

お客様相談室 03-3370-7174(代表)

<http://www.nippo-yakuhin.jp/>



製造販売元

福井製薬株式会社

大阪市城東区今福東3丁目1番26号

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話:0120-149-931(フリーダイヤル)