

第3類医薬品

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
又、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

L-システイン製剤

# ピュアプラス<sup>®</sup>ホワイト

本剤はL-システインを主剤とし、これにビタミンC、パントテン酸カルシウムを配合したL-システイン製剤です。

L-システインは、しみ・そばかすの原因となる過剰なメラニン色素ができるのをおさえ、ビタミンCと協力して、しみ・そばかす・日焼けなどの色素沈着を改善します。又、代謝酵素の働きを助け、全身倦怠、二日酔いにも効果をあらわします。



## 使用上の注意



### 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発 疹
消化器	吐き気・嘔吐、腹痛

- \* 2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 《効能又は効果》

- しみ・そばかす・日焼けなどの色素沈着症
- 全身倦怠
- 二日酔い
- にきび、湿疹、じんましん、かぶれ、くすりまけ

## 《用法及び用量》

次の量を1日3回、水又は白湯で服用してください。

年 齢	1 回服用量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	2 錠	3 回
7 歳以上15歳未満	1 錠	
7 歳未満	服用しないこと	

### < 用法・用量に関連する注意 >

- (1) 定められた用法、用量をお守りください。
- (2) 7歳以上15歳未満の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 本剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

## 《成分及び分量》

6錠（成人1日量）中

アスコルビン酸カルシウム	363mg
（アスコルビン酸（ビタミンC）として300mg）	
パントテン酸カルシウム	24mg
L-システイン	240mg

添加物として、乳酸Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、白糖、タルク、アラビアゴム、酸化チタン、カルナウバロウを含有する。

### < 成分・分量に関連する注意 >

ビタミンCを含有する製剤は、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

## 《保管及び取扱い上の注意》

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
4. 本剤にぬれた手で触れないでください。又、手にとった錠剤を元の容器にもどしますと、他の錠剤に影響を与えることがありますのでご注意ください。
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは下記にお願い申し上げます。

大峰堂薬品工業株式会社 「消費者相談窓口」

電話 (0745) 22 - 3601 (代)

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

**大峰堂薬品工業株式会社**

奈良県大和高田市根成柿574