

生 薬
日本薬局方
コウジン
(紅 参)

刻

第3類医薬品

△(使用上の注意)

⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

高熱のある人

📎相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 2.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(用法・用量)

大人(15歳以上)は、1日量10gを水約600mLをもって煮て約400mLに煮つめ、かすをこして取り去り、食前または食前3回に分服してください。

○用法・用量に関連する注意

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)15歳未満の小児には服用させないでください。

【効能・効果】

次の場合の滋養強壮：

虚弱体質、肉体疲労、病中病後、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりと閉めて保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり、品質が変わるため。)

【副作用被害救済制度】 ☎0120-149-931

500g



4 987457 629014

E1



製造販売元
松浦薬業株式会社

名古屋市昭和区円上町24-21

お客様相談窓口 TEL 052-883-5172

受付時間 10:00~17:00

(土・日・祝日を除く)