

\*\*2013年4月改訂  
\*2008年9月改訂

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

成人用滋養強壯薬

ネオ

# 金龍

(カプセル)

第2類医薬品

ネオ金龍(カプセル)

ネオ金龍(カプセル)は動物性、植物性の強壯生薬を配合した、成人用滋養強壯薬です。

各成分の作用により、滋養強壯剤として肉体疲労時にすぐれた効果をあらわします。

●ネオ金龍(カプセル)に配合される強壯生薬

★動物性強壯生薬

●海馬(カイバ)

タツノオトシゴの内臓を除去して乾燥させたもので、内分泌器官に働きかけ、ホルモン様作用を示します。この作用が、強壯に効果をあらわします。

●鹿茸(ロクジョウ)

マンシュウアカジカ等の袋角で、多くの滋養強壯成分を含みます。その滋養成分が体を補い、滋養強壯の働きにすぐれています。

★植物性強壯生薬

●ニンジン(高麗人参)

朝鮮人参のすぐれた成分と全身に働きかける強壯、抗疲労作用は研究され、汎用されている強壯生薬です。

●反鼻(ハンビ)

一般にはマムシとして知られ、強壯剤として利用されます。アミノ酸群等の滋養強壯成分を含んでいます。

●牛黄(ゴオウ)

牛の胆のう及び胆管結石で、特に心臓、神経、血管系に働きかけて全身の強壯作用をあらわす成分を含んでいます。

●淫羊藿(インヨウカク)

滋養強壯剤として、肉体疲労時に効果がある薬草として利用されています。



## 使用上の注意



### 相談すること

- \* \* 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 次の診断を受けた人  
高血圧
- \* \* 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

- \* まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- \* \* 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
口のかわき、軟便、下痢

効能・効果、用法・用量、成分・分量、保管及び取扱い上の注意、お問い合わせ先については、裏面をよくご覧下さい。

## 【効能・効果】

### ●次の場合の滋養強壮：

虚弱体質、肉体疲労、病中病後、胃腸虚弱、食欲不振

## 【用法・用量】

次の量を、食後に、水又はお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2カプセル	2回
15歳未満	服用しないこと	

服用時間を守りましょう。

食後：食事のあと30分位を指します。

### <用法・用量に関連する注意>

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)によるものですから心配ありません。

## 【成分・分量】4カプセル(成人1日量)中

成分	分量	成分	分量
ローヤルゼリー末	60.0mg	タウリン	100.0mg
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	80.0mg	パントテン酸カルシウム	50.0mg
ロクジョウ末	100.0mg	グルクロン酸ラクトン	50.0mg
カイバ末	100.0mg	ルチン水和物	40.0mg
ゴオウ末	30.0mg	安息香酸ナトリウムカフェイン	100.0mg
ニンジン末	150.0mg	ニコチン酸アミド	40.0mg
ハンピ末	200.0mg	リボフラビン(ビタミンB <sub>2</sub> )	4.0mg
カシュウ末	120.0mg	ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )	10.0mg
インヨウカクエキス (インヨウカク937.5mgより製したエキス)	150.0mg		

添加物としてカルメロースCa、無水ケイ酸、セルロース、ゼラチン、酸化チタンを含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)ビンのフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。
- (5)ビンの中の詰め物は、輸送中にカプセル剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6)箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。
- (7)一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (8)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## お問い合わせ先

本製品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡お願い申し上げます。

摩耶堂製薬株式会社 「くすりの相談室」

〒651-2142 神戸市西区二ツ屋 1-2-15 電話 (078)929-0112

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日、弊社休日を除く)



製造販売元

摩耶堂製薬株式会社

神戸市西区玉津町居住65-1