



服用の際にはこの説明書を必ずお読みください。また必要な時に読めるよう保管してください。

※2013年9月改訂
(記載要領変更に伴う改訂)

フ ヨ ウ ト ウ 婦 養 湯

◆疲れ易く、冷え性で精神不安などのある婦人におすすめする生薬煎じ薬です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと。
グリチルリチン酸等を含有する内服薬（肝疾患用剤、抗ヒスタミン剤、胃腸薬、鎮咳去痰薬）
2. 長期連用しないこと。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 高齢者。
 - (2) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (3) 医師の治療を受けている人。
 - (4) 次の症状のある人。むくみ
 - (5) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病
 - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文章をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合
- (2) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診断を受けること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

3. 5～6日間服用しても症状の改善がみられない場合は、この文章をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能・効果、用法・用量、成分・分量、保管及び取扱い上の注意、
お問い合わせ先については裏面をよくご覧ください。

〔効能・効果〕

月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症、冷え性

〔用法・用量〕

成人(15歳以上)、1日1包に水約300mlを加えて約200mlに煮詰め、3回に分割して食前又は食間に服用する。

※15歳未満は服用しないこと。

〈用法及び用量に関連する注意〉



定められた用法・用量を厳守してください。

〔成分・分量〕 1包中(18.2g)

日本薬局方	カンゾウ	1.0g	日本薬局方	トウキ	4.0g
日本薬局方	サフラン	0.2g	日本薬局方	ブクリョウ	3.0g
日本薬局方	サンシシ	1.0g	日本薬局方	ボタンピ	2.0g
日本薬局方	ショウキョウ	1.5g	日本薬局方	ビャクジュツ	1.5g
日本薬局方	センキュウ	4.0g			

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3) 誤用をさげ、品質保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- (4) 本剤は生薬を原料とした製品ですので、吸湿してカビが生えたり、虫がつくこともありますので保管には充分ご注意ください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は服用しないで下さい。



◆包装 5包入(5日分)

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

株式会社 ツク ダ サン ジュ エン シャ 築田三樹園社

お客様相談係 電話(082)221-3603
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日は除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

ツク ダ サン ジュ エン シャ
株式会社 築田三樹園社

広島市中区東白鳥町21-21