

この説明書は、使用前に必ずお読み下さい。  
また、必要時に読めるよう保管しておいて下さい。

# 女性ホルモン軟膏 ダンテルモンFパスター

第②類医薬品

生体内では、女性ホルモンは卵巣等から主に分泌されます。これらの臓器の機能が未成熟であったり加齢と共に衰えてきたりしますと、女性ホルモンが体内で不足してきて、その結果、不感症、冷感症、婦人更年期障害、婦人神経衰弱症などが現れてきます。

このような場合に外部から不足の女性ホルモンを補うことで、症状の軽減を目的とした薬剤が「ダンテルモンFパスター」です。

本品には女性ホルモンであるエストラジオールが配合されております。

この女性ホルモンは皮ふや、粘膜にすり込むことにより、大変吸収されやすい性質を持っておりますので、女性ホルモンの分泌不足による各症状の改善を期待することができます。



## 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は使用しないこと

- (1)小児、妊婦又は妊娠していると思われる人、授乳婦、皮ふ過敏症の人
- (2)使用前に本剤をチューブから5mm程度出し、内股などの皮ふの薄い所にすり込んで、翌日中に薬疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれ等の症状があらわれた人
- (3)塗る所又は局所に外傷、炎症、化膿、湿疹、おりもの等がある人
- (4)血栓症、高血圧症、肝機能障害のある人
- (5)心疾患、腎疾患のある人、又はその既往歴のある人
- (6)子宮筋腫のある人
- (7)乳房又は子宮に腫瘍がある人、及びこれらのおそれがある人
- (8)家族あるいは本人に悪性腫瘍の病歴がある人

#### 2. 次の部位には使用しないこと

- (1)目や目の周囲
- (2)湿疹、ただれ、外傷のひどい患部

#### 3. 本剤を使用している間は、同じ成分を含んだいずれの医薬品も使用しないこと

#### 4. 内服用や眼科用に使用しないこと

#### 5. 本剤を出しすぎた場合は、チューブに戻さないこと



### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2)薬や化粧品等によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ等)を起こしたことがある人
- (3)本人又は家族がアレルギー体質の人

#### 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ(塗った所)	発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、薬疹
乳房	痛み、張り

- (2)生理の周期及び月経血の様子が著しく変調した場合

- (3)2～3週間使用しても症状がよくなる場合

## 【効能・効果】

1. 卵黄ホルモン分泌不足に原因する皮膚科諸疾患、粗荒（角質化）、面疱、剛毛発生の抑制（顔面、体部）・促進（頭部）
2. 内科的婦人科的女性ホルモン分泌不足に起因する諸障害  
子宮発育不全、無月経、月経不順、月経寡少、不妊症、不感症、子宮内膜炎、陰部そう痒症、老人性膣炎
3. 更年期障害諸症、婦人老衰現象の防止、四肢冷感

### ※症状の解説

面疱：にきび

月経寡少：月経血の少ないもの

不感症：性欲があり、実際性交を行っている女性で、性交感やオルガニズムを欠くか不十分なもの

陰部そう痒症：陰部のかゆみ

更年期障害諸症：加齢に伴う卵巣機能の衰えにより、女性ホルモンの分泌が衰えることから生じる、様々な自覚症状（のぼせ、ほてり、冷え、イライラ等）

四肢冷感：手足の冷え

## 【用法・用量】

表皮の薄い部位やその他の患部<sup>注)</sup>をきれいにし、1回約0.1g（小豆大）を1日1～2回、手にとってすりこんで下さい。

注) その他の患部：女性局所の粘膜（膣内部）など

## 【用法・用量に関連する注意】

1. 定められた用法・用量を守って下さい。
2. 他の塗布剤との併用はさけて下さい。
3. 外用にのみ使用し、内服しないで下さい。

## 【成分・分量】

本品1g中

有効成分	エストラジオール ……………0.04mg
------	----------------------

添加物 親水ワセリン、エタノールを含有する。

## 【保管及び取扱い上の注意】

1. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
2. 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
3. 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れ替えないで下さい。
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。
5. 本剤をチューブから出しにくい場合は、手のひら等で1～2分温めてから使用して下さい。

## 【包装】

10g

本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

原沢製薬工業株式会社 開発本部 お客様相談室

電話：(03) 3441-5191

受付時間：9:30～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売 

原沢製薬工業株式会社

東京都港区高輪3丁目19番17号