

この説明書は、服用前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

抗アレルギー剤

第2類医薬品

# プラタギン<sup>®</sup>

私達の体の中にはヒスタミンと呼ばれる物質があります。これはふだんは特定の細胞中において、その作用を示しません。例えばうるしに触れたり、鶏卵や鯖などを食べたりすると、それらに敏感な人では、ヒスタミンがその作用を示し、発疹ができたり腫れたりします。

プラタギンは、このヒスタミンの作用を効果的に抑制する抗ヒスタミン剤クロロフェニラミンマレイン酸塩を主剤とし、甘草（カンゾウ）の抽出成分で抗炎症作用のあるグリチルリチン酸二カリウム、カルシウム補給剤グルコン酸カルシウム水和物を含み、アレルギーによる諸症状を改善します。

## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. **本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください**  
他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬）
2. **服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください**  
(眠気があらわれることがあります。)
3. **長期連用しないでください**



### 相談すること

1. **次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください**
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
  - (6) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、腎臓病、緑内障
2. **次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください**
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位  | 症 状        |
|-------|------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ  |
| 消 化 器 | 悪心・嘔吐、食欲不振 |
| そ の 他 | 排尿困難       |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療をうけてください。

| 症状の名称     | 症 状   |
|-----------|---|
| 偽アルドステロン症 | 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。 |

(2)5～6日間服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください  
□のかわき

## ■ 効能・効果

じんましん、湿疹、かぶれ、かゆみ、鼻炎

## ■ 用法・用量

1日3回、次の量を服用してください。

| 年 齢       | 1回量               |
|-----------|-------------------|
| 15才以上     | 3錠                |
| 11才～15才未満 | 2錠                |
| 8才～11才未満  | 1 $\frac{1}{2}$ 錠 |
| 5才～8才未満   | 1錠                |

### 【用法・用量に関連する注意】

- (1)用法・用量を必ず守ってください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)のどにつかえるといけませんから、本剤は5才未満の乳幼児には服用させないでください。

### 【服用時のアドバイス】

- いつ服用されても結構ですが、一般的には食後に服用してください。
- 誤って、以前にかぶれた経験がある物に触れてしまった時や、じんましんを起こした経験がある食物を食べてしまった時は、直ちに服用してください。
- 痒みが強い時は、夜中にかきむしってしまう事が多く、かきこわしを起こしやすいので、就寝前に服用してください。

## ■ 成分と働き


3錠中に次の成分を含んでいます。

| 成 分             | 含 量   | 働 き                                      |
|-----------------|-------|--|
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 3.9mg | アレルギー性の皮膚病のかゆみや鼻炎に効果があります。               |
| グリチルリチン酸二カリウム   | 39mg  | 炎症を抑える作用があるため、鼻炎に伴なう症状に効果があります。          |
| グルコン酸カルシウム水和物   | 360mg | アレルギーによって起こる症状を緩和する働きがあり、カルシウムの補給にもなります。 |

添加物として乳糖、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、セルロースを含んでいます。

## ■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。



副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

## お問い合わせ先

本剤の服用により、何か変わった症状があらわれるなど、お気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

三宝製薬株式会社 お客様相談室 電話03-3952-0100  
月～金曜日 9:00～17:00 (祝祭日を除く)



製造販売元  
**三宝製薬株式会社**

東京都新宿区下落合2-3-18